

Recopilación bibliográfica de citas liquénicas de Galicia (1851-1993)

R. CARBALLAL *, M. E. LÓPEZ DE SILANES **, L. BAHILLO * & J. ALVAREZ **

* Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología
Universidad de Santiago de Compostela

** Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Universidad de Vigo

Resumen

CARBALLAL, R., LÓPEZ DE SILANES, M. E., BAHILLO, L. & ALVAREZ, J. (1995). Recopilación bibliográfica de citas liquénicas de Galicia (1851-1993). *Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía)*, 5: 49-134

La lista presentada comprende todas las especies de líquenes de Galicia citadas en la bibliografía, de 1851 hasta 1993, con mención de la fuente bibliográfica de cada cita y del nombre bajo el cual ha sido hecha. La lista totaliza 725 táxones, procedentes de 293 localidades distintas, de las que se ofrece un listado general.

Palabras clave: Líquenes, bibliografía, Galicia, España.

Abstract:

CARBALLAL, R., LÓPEZ DE SILANES, M. E., BAHILLO, L. & ALVAREZ, J. (1995). Bibliographical summary of lichenical appointments in Galicia (1851-1993). *Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía)*, 5: 49-134

The present list includes all the lichen species recorded from Galicia (NW Spain) and published from 1851 to 1993. The records of each taxon are taken mentioning the bibliographical source and the name used by the authors. The list includes finally 725 taxa, collected in 293 different localities, from which we offer a general list.

Key words: Lichens, bibliography, Galicia, Spain.

INTRODUCCION

Este trabajo es una aportación a la base de datos necesaria para elaborar la «Flora liquénica de la Península Ibérica e Islas Baleares», tarea en la que están implicados liquenólogos de toda España, en los proyectos PB89-0518-CO2 y PB92-0795-CO2. La publicación de citas referidas a Galicia es de gran utilidad para los propios liquenólogos que trabajan en ésta o en zonas próximas y para otros investigadores, que pueden obtener información difícil de conseguir directamente de las publicaciones originales.

Por otra parte, el catálogo da una idea de la riqueza florística general, de las zonas sin datos liquénicos y de los autores que sobre el tema se pueden consultar.

MATERIAL Y METODOS

El método seguido para realizar este inventario ha sido la recopilación de todas las citas para Galicia de especies liquénicas en trabajos publicados desde COLMEIRO (1851) hasta los de 1993. Se ha comenzado desde COLMEIRO (op. cit.), por

ser el primer trabajo botánico en el que se recogen citas de líquenes de Galicia.

Algunas citas de trabajos antiguos han sido imposibles de referir a un taxón concreto, sería necesario una revisión del material original. Figuran en el texto, en el apartado de nombres dudosos, al final del catálogo.

La nomenclatura se corresponde fundamentalmente con PURVIS *et al.* (1992, 1993). Para aquellos táxones que no figuran en estas obras y para la comprobación de sinonimias, seguimos a BOISTEL (1900), SMITH (1918, 1926), ZSCHACKE (1933, 1934), KEISSSLER (1930, 1938, 1960), POELT (1969), OZENDA & CLAUZADE (1970), POELT & VEZDA (1977, 1981), HAWKSWORTH *et al.* (1980), SANTESSON (1984), CANNON (1985), EGAN (1987, 1989), NIMIS (1993).

Los géneros se han ordenado por orden alfabético y dentro de ellos también las especies. Se ha optado por este criterio, para facilitar la consulta y por la diversidad de opiniones sobre la posición taxonómica correcta de numerosos géneros y familias. A pesar de ello, antes de comenzar el catálogo, se presenta un esquema taxonómico, basado en ERIKSSON & HAWKSWORTH (1986a,b,c,d), donde se sitúan los géneros tratados dentro de las familias y los órdenes pertinentes.

En cada especie, se indican citas, localidades y en algunos casos, los sinónimos más recientes. En sinónimos dudosos, el nombre del taxón aparece entre interrogantes. Si el autor está entre interrogantes, queremos indicar que el taxón ha sido citado con la misma denominación específica pero con autores diferentes, no localizados en las referencias bibliográficas.

Dada la cantidad de localidades citadas en el texto, nos ha parecido oportuno presentar un listado indicando: nombre del lugar, parroquia, entre paréntesis concejo y provincia y siempre que ha sido posible UTM y altura.

En cuanto a la denominación de las localidades, se han seguido las recomendaciones de la Comisión de Toponímias. Por ello, muchas de las localidades que se citan en este trabajo con su topónimo en gallego, en las publicaciones utilizadas como fuentes aparecen con su denominación en castellano (ej.: Corgo do Aguacenza = Altos de Guasenza).

Cuando coincide la localidad con un municipio, omitimos el nombre del lugar y el nombre

de la parroquia (ej.: Santiago de Compostela, C).

Si aparecen varios concellos unidos por un guion, significa que la localidad se halla en el límite de esos concellos [ej.: A Fracha (Pontevedra-Cotobade-Ponte Caldelas, Po)].

Cuando la localidad citada en el texto, es una zona geográfica amplia, (ej.: Ría de Vigo, Costa de Camelle), se dan las coordenadas UTM con dos cifras o no se dan cuando se considera fácil su localización.

Se adjunta un índice de táxones para facilitar la consulta, en el que los nombres genéricos aparecen en mayúsculas, los nombres actuales de especies en negrita y los sinónimos en letra normal.

El conjunto de táxones que figuran en este inventario no representa la totalidad de la flora liquénica de Galicia, pues amplias zonas están sin explorar, sobre todo en áreas pertenecientes a las provincias de Ourense y Lugo, por otra parte los líquenes saxícolas han sido poco estudiados.

El material de los trabajos realizados por los miembros del equipo de liquenología de las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo (R. Carballal, M. E. López de Silanes, L. Bahillo, A. García-Molares, M. J. Sánchez-Biezma, J. Alvarez, G. Paz, C. Pérez) se encuentran depositados en el herbario de la Universidad de Santiago.

RESULTADOS

SINOPSIS TAXONÓMICA DE GÉNEROS

Orden ARTHONIALES Henssen ex D. Hawksw.
& O. Eriksson 1986

Familia ARTHONIACEAE Reichenbach ex
Reichenbach 1841

Arthonia Ach. 1806

Arthothelium Massal. 1852

Familia CHRYSOTRICACEAE Zahlbr. 1905
Chrysotrix Mont. 1852

Orden CALICIALES Bessey 1907

Familia CALICIACEAE Chevall. 1826

Calicium Pers. 1794

Cyphelium Ach. 1815

Familia	<i>CONIOCYBACEAE</i>	Reichenbach 1837	Orden LECANORALES
	<i>Chaenotheca</i> (Th. Fr.) Th. Fr.	1860	Familia <i>ACAROSPORACEAE</i> Zahlbr. 1906
Familia	<i>SPHAEROPHORACEAE</i>	Reichenbach 1841	<i>Acarospora</i> Massal. 1852
	<i>Sphaerophorus</i> Pers.	1794	<i>Polysporina</i> Vezda 1978
Familia	<i>SPHINCTRINACEAE</i>	M. Choisy 1950	<i>Sarcogyne</i> Flotow 1851
	<i>Sphinctrina</i> Fr.	1828	<i>Strangospora</i> Körber 1860
Orden	DOTHIDEALES	Lindau 1897	Familia <i>AGYRIACEAE</i> Corda 1838
Familia	<i>ARTHOPYRENIACEAE</i>	W. Watson 1929	<i>Xylographa</i> (Fr.) Fr. 1838
	<i>Arthopyrenia</i> Massal.	1852	Familia <i>ALECTRIACEAE</i> (Hue) Tomason 1949
	<i>Leptorraphis</i> Körber	1855	<i>Alectoria</i> Ach. 1810
	<i>Genera incertae sedis</i>		Familia <i>BACIDIACEAE</i> W. Watson 1929
	<i>Lichenothelia</i> D. Hawksw.	1981	<i>Adelolecia</i> Hertel & Hafellner 1984
Orden	GRAPHIDALES	Bessey 1907	<i>Bacidia</i> de Not. 1846
Familia	<i>ASTEROTHYRIACEAE</i>	W. Watson ex R. Sant. 1953	<i>Biatora</i> Fr. 1817
	<i>Gyalidea</i> Lettau	1937	<i>Cliostomum</i> Fr. 1825
Familia	<i>GOMPHILLACEAE</i>	W. Watson ex Hafellner 1984	<i>Lecania</i> Massal. 1853
	<i>Gyalideopsis</i>	Vezda 1972	? <i>Squamaria</i> Poelt 1958
Familia	<i>GRAPHIDACEAE</i>	Dumort. 1822	<i>Tephromela</i> M. Choisy 1929
	<i>Graphina</i> Müll. Arg.	1880	<i>Toninia</i> Massal. 1856
	<i>Graphis</i> Adans.	1763	<i>Tylothallia</i> P. James & Kilias
	<i>Phaeographis</i> Müll. Arg.	1882	Familia <i>CANDELARIACEAE</i> Hakul. 1954
Familia	<i>THELOTREMATACEAE</i>	(Nyl.) Stizenb. 1862	<i>Candelaria</i> Massal. 1852
	<i>Diploschistes</i> Norman	1853	<i>Candelariella</i> Müll. Arg. 1894
	<i>Thelotrema</i> Ach.	1803	Familia <i>CATILLARIACEAE</i> Hafellner 1984
Orden	GYALECTALES		<i>Catillaria</i> Massal. 1852
Familia	<i>GYALECTACEAE</i>	(Massal.) Stizenb. 1862	Familia <i>CLADONIACEAE</i> Zenker 1827
	<i>Dimerella</i> Trevisan	1880	<i>Cladonia</i> Hill ex P. Browne 1756
	<i>Gyalecta</i> Ach.	1808	<i>Pycnothelia</i> (Ach.) Duf. 1821
	<i>Pachyphiale</i> Lönnr.	1858	Familia <i>COCCOCARPIACEAE</i> (Mont. ex C. Müller) Henssen 1986
Orden	HELOTIALES		<i>Spilonema</i> Bornet 1856
Familia	<i>BAEOMYCETACEAE</i>	Dumort. 1829	Familia <i>COLLEMATACEAE</i> Zenker 1827
	<i>Baeomyces</i> Pers.	1794	<i>Collema</i> Weber ex Wigg. 1780
			<i>Leptogium</i> (Ach.) Gray 1821
Familia	<i>ECTOLECHIACEAE</i>	Zahlbr. 1905	Familia <i>ECTOLECHIACEAE</i> Zahlbr. 1905
			<i>Lopadium</i> Körber 1855
Familia	<i>EIGLERACEAE</i>	Hafellner 1984	Familia <i>EIGLERACEAE</i> Hafellner 1984
			<i>Eiglera</i> Hafellner 1984
Familia	<i>HAEMATOMMATACEAE</i>	Hafellner 1984	Familia <i>HAEMATOMMATACEAE</i> Hafellner 1984
			<i>Haematomma</i> Massal. 1852
			<i>Ophioparma</i> Norman 1853

- Familia *HYMENELIACEAE* Körber 1855
Aspicilia Massal. 1852
Hymenelia Krempelh. 1852
- Familia *LECANORACEAE* Körber 1855
Carbonea (Hertel) Hertel 1983
Lecanora Ach. 1810
Lecidella Körber 1855
Megalaria Hafellner 1984
Protoparmelia M. Choisy 1929
Pyrrhospora Körber 1855
Rhizoplaca Zopf 1905
Scoliciosporum Massal. 1852
- Familia *LECIDACEAE* Chevall. 1826
Hypocenomyce M. Choisy 1951
Lecidea Ach. 1803
- Familia *LITHOGRAPHACEAE* Poelt 1974 ad int.
Lithographa Nyl. 1857
- Familia *MICAREACEAE* Vezda ex Hafellner 1984
Micarea Fr. 1825
Psilolechia Massal. 1860
- Familia *PANNARIACEAE* Tuck. 1871
Degelia Arvidsson & Galloway 1981
Moelleriopsis Gyelnik 1940
Pannaria Delise ex Bory 1828
Parmeliella Müll. Arg. 1862
Psoroma (Ach.) Michaux 1803
- Familia *PARMELIACEAE* Eschw. 1824
Bryoria Brodo & D. Hawksw. 1977
Cetraria Ach. 1803
Cetrelia Culb. & C. Culb. 1968
Coelocaulon Link 1833
Cornicularia Hoffm. 1794
Evernia Ach. 1810
Hypogymnia (Nyl.) Nyl. 1896
Imshaugia G. Meyer 1985
Menegazzia Massal. 1854
Parmelia Ach. 1903
Parmeliopsis (Nyl.) Nyl. 1866
Platismatia Culb. & C. Culb. 1968
Pseudevernia Zopf 1903
Usnea Dill. ex Adans. 1753
- Familia *PHYSCIACEAE* Zahlbr. 1907
Anaptychia Körber 1848
- Buellia* de Not. 1846
Diploicia Massal. 1852
Heterodermia Trevisan 1868
Hyperphyscia Müll. Arg. 1894
Phaeophyscia Moberg 1977
Physcia (Schreber) Michaux 1803
Physconia Poelt 1965
Rinodina (Ach.) Gray 1753
- Familia *PILOCARPACEAE* Zahlbr. 1905
Byssoloma Trevisan 1853
Fellhanera Vezda 1986
- Familia *PORPIDIACEAE* Hertel & Hafellner 1984
Porpidia Körber 1855
- Familia *PSORACEAE* Fink 1910
?Lecidoma Schneider & Hertel 1981
Protoblastenia (Zahlbr.) Steiner 1911
- Familia *RAMALINACEAE* Agardh 1821
Ramalina Ach. 1810
- Familia *?RHIZOCARPACEAE* M. Choisy ex Hafellner 1984
Rhizocarpon Lam. ex DC. 1805
- Familia *RIMULARIACEAE* Hafellner 1984
Rimularia Nyl. 1868
- Familia *STEREOCAULACEAE* Chevall. 1826
Stereocaulon Hoffm. 1796
- Familia *TRAPELIACEAE* Hertel 1970
Placynthiella Elenkin 1909
Trapelia M. Choisy 1929
Trapeliopsis Hertel & Schneid. 1980
- Familia *UMBILICARIACEAE* Chevall. 1826
Lasallia Merát 1821
Umbilicaria Hoffm. 1789
- Genera incertae sedis*
Melaspilea Nyl. 1856
- Orden LICHINALES Henssen & Büdel 1986
- Familia *LICHINACEAE* Nyl. 1854
Ephebe Fr. 1825
Lichina Agardh 1817

- Phylliscum* Nyl. 1855
Porocyphus Körber 1855
- Orden OPEGRAFALES M. Choisy ex D. Hawksw. & O. Eriksson
- Familia OPEGRAFACEAE Stizenb. 1862
Chiodecton Ach. 1814
Enterographa Fée 1824
Lecanactis Körber 1825
Opegrapha Humb. 1793
Schismatomma Flotow & Körber ex Massal. 1852
Sclerophyton Eschw. 1824
- Familia ROCCELLACEAE
Dirina Fr. 1825
Rocella DC. 1805
- Genera incertae*
Cresponea Egea & Torrente 1993
Llimonaea Egea & Torrente 1991
- Orden OSTROPALES Nann. 1932
- Familia ODONTOTREMATACEAE D. Hawksw. & Sherw. 1982
Ramonia Stizenb. 1862
- Familia STICTIDACEAE Fr. 1849
Thelopsis Nyl. 1855
- Orden PELTIGERALES W. Watson 1929
- Familia LECOTHECIACEAE Körber 1855
Placynthium (Ach.) Gray 1821
?Polychidium (Ach.) Gray 1821
- Familia LOBARIACEAE Chev. 1826
Dendriscocaulon Nyl. 1885
Lobaria (Schreber) Hoffm. 1796
Pseudocyphellaria Vainio 1890
Sticta (Schreber) Ach. 1803
- Familia NEPHROMACEAE Wetm. 1960 ad. int.
Nephroma Ach. 1810
- Familia PELTIGERACEAE Dumort. 1822
Peltigera Willd. 1787
Solorina Ach. 1808
- Orden PERTUSARIALES M. Choisy ex D. Hawksw. & O. Eriksson 1986
- Familia PERTUSARIACEAE Körber ex Körber 1855
Ochrolechia Massal. 1852
Pertusaria DC. 1805
Thelenella Nyl. 1855
- Orden PEZIZALES C. Bessey 1987
- Familia ?SCHAERERIACEAE M. Choisy ex Hafellner 1984
Schaereria Körber 1874
- Orden PYRENULALES Fink ex D. Hawksw. & O. Eriksson 1986
- Familia PYRENULACEAE Rabenh. 1870
Acrocordia Massal. 1854
?Eopyrenula R. C. Harris 1973
?Pyrenocollema Reinke 1885
Pyrenula Massal. 1852
- Orden TELOSCHISTALES D. Hawksw. & O. Eriksson 1986
- Familia ?FUSCIDEACEAE Hafellner 1984
Fuscidea Wirth & Vezda 1972
Maronea Massal. 1856
- Familia TELOSCHISTACEAE Zahlbr. 1907
Caloplaca Th. Fr. 1860
Fulgensia Massal. & de Not. 1972
Teloschistes Norman 1853
Xanthoria (Fr.) Th. Fr. 1880
- Orden VERRUCARIALES Mattick ex D. Hawksw. & O. Eriksson 1956
- Familia VERRUCARIACEAE Eschw. 1824
Catapyrenium Flotow 1850
Dermatocarpon Eschw. 1924
Endocarpon Hedw. 1789
Macentina Vezda 1973
Muellerella Hepp 1862
Polyblastia Massal. 1852
Verrucaria Schrader 1794
- Familia TRICHTHELIACEAE (Müll. Arg.) Bitter & Schilling 1927
Porina Müll. Arg. 1883

Familia incertae sedis

Familia *PHLYCTIDACEAE* Poelt & Vezda
1981 ad int.

Phlyctis Wallr. 1825

Generae incertae sedis

Anisomeridium (Müll. Arg.) M.
Choisy 1928

Normandina Nyl. 1855

Lepraria Ach. 1803

Leprocaulon Nyl. ex Lamy 1878

Leproloma Nyl. ex Crombie 1894

RELACIÓN DE TÁXONES**ACAROSPORA** Massal. (1852)

Acarospora chlorophana (Wahlenb.) Massal.

Courel (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889,
como *Lecanora c. Ach.*).

Acarospora glaucoatra (Ach.) Körber

Preto de Tui (Leg. L. Seoane) [COLMEIRO,
1889, como *Lecanora cervina* Ach. var. *castanea*
(Schaerer) Nyl.].

Acarospora fuscata (Schrader) Th. Fr.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL,
1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA &
LÓPEZ DE SILANES, 1992; SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*,
1992), Silvela (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Acarospora smaragdula (Wahlenb.) Massal.

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *A.
Lesdainii* G. Samp.), Pedra do Lagarto (SAMPAIO
& CRESPI, 1927, como *A. Lesdainii* G. Samp. y *A.
Lesdainii* G. Samp. var. *Albertii* G. Samp.),
Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL,
1991a).

ACROCORDIA Massal. (1854)

Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris

A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.

Lourizán (CARBALLAL *et al.*, 1983), Quiñones
de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), A Guía
(CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b),
Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES,
1988), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES,
1991).

ADELOLECIA Hertel & Hafellner (1984)

Adelolecia pilati (Hepp) Hertel & Hafellner

Barbeitos (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

ALECTORIA Ach. (1810)

Alectoria jubata (L.) Ach.

Río Deo (DALDA, 1972). Al no haber revisado
el material original, podría estar incluida tanto
Bryoria chalybeiformis como en *B. fuscescens*.

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

ANAPTYCHIA Körber (1848)

Anaptychia ciliaris Körber ex Massal.

Preto de Cuntis (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO,
1889, como *Physcia c. DC.* var. *solenaria*
Schaerer).

Anaptychia runcinata (With.) Laundon
[= *A. fusca* (Huds.) Vain.]

Vigo [LÁZARO-IBIZA, 1898, como *Physcia
aquila* (Ach.) Nyl.], Viveiro, Vigo (Leg. L.
Seoane, Lazaro)(COLMEIRO, 1889, como *Physcia
aquila* Nyl.), preto de Lugo (Leg. Lagasca)
(COLMEIRO, 1889, como *Physcia aquila* Nyl. var.
platyphylla Lange), A Fracha, A Lanzada, Mon-
te Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como

Physcia f. A. L. Sm.), Corrubedo, Cabo Silleiro (BAHILLO *et al.*, 1987), A Coruña, San Gregorio, Punta Pesqueira, areal de Cabanas (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

ANISOMERIDIUM (Müll. Arg.) M. Choisy (1928)

Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris

Cangas, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lejophlea biformis* G. Samp.), Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991).

Anisomeridium macrocarpum (Körber) V. Wirth

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b).

ARTHONIA Ach. (1806)

Arthonia cinnabrina (DC.) Wallr.

[= *Arthonia tumidula* (Ach.) Ach.]

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *A. gregaria* Körber y como *A. gregaria* Körber var. *pruinata* A. L. Sm.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, As Cavadas, Regueiro Valado, Monte da Arca Aberta, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b).

Arthonia didyma Körber

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Escourido (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

Arthonia elegans (Ach.) Almq.

As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981).

Arthonia epiphyscia Nyl.

A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

Arthonia fuliginosa (Turner & Borrer) Flotow

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b).

Arthonia galactites (DC.) Dufour

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991).

Arthonia ilicina Taylor

Caaveiro [LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, como *Arthothelium ilicinum* (Taylor) P. James var. *ilicinum*].

Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), A Coruña (CARBALLAL *et al.* 1990 b).

Arthonia mediella Nyl.

Regueiro de Reboredo, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981).

Arthonia radiata (Pers.) Ach.

Redondela, Pedra do Lagarto, A Lanzada, Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, río Beduido (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1987a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira, Moredo (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1992), Xanceda (GARCIA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Arthonia reniformis (Pers.) Ach.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987).

Arthonia spadicea Leighton

Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

Arthonia stellaris Krempelh.

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, de Ordes a Carral, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b).

Arthonia vinosa Leighton

A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), ponte de Seoane a Folgoso, de Folgoso a la Pendella, pista de Seoane a Visuña, Eiriz, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b).

ARTHOPYRENIA Massal. (1852)*Arthopyrenia antecellans* (Nyl.) Arnold

Pedra do Lagarto [SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *A. antecellens* (Nyl.) Arnold], Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Regueiro Valado, Monte da Arca Aberta, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Castiñeira (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, como *A. antecellens* (Nyl.) Arnold], A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Ourense [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992, como *A. antecellens* (Nyl.) Arnold], Campelo, O Couso, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Xanceda (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Arthopyrenia cerasi (Schrader) Massal.

A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaerer) Massal.

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Arthopyreniac. Körber* var. *olivetorum* G. Samp., taxon que consideramos sinónimo), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b).

Arthopyrenia inconspicua Lahm.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Arthopyrenia lapponica Anzi

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Mangüero (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Arthopyrenia punctiformis Massal.

Preto a Central de Meirama (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Campelo, Fornelos de Montes (BAHILLO & CARBALLAL, 1991; BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

ARTHOTHELIUM Massal. (1852)*Arthothelium ruanum* (Massal.) Zwackh

Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b).

Arthothelium taediosum (Nyl.) Müll. Arg.

Lourizán (CARBALLAL *et al.*, 1985).

ASPICILIA Massal. (1852)*Aspicilia caesiocinerea* (Nyl. ex Malbr.) Arnold

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992; SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Aspicilia cinerea (L.) Körber

Preto de Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Lecanora c.* Nyl.?).

Aspicilia cupreogrisea (Th. Fr.) Hue

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Aspicilia gibbosa (Ach.) Körber

A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987).

Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold

Monte Galiñeiro, A Fracha, Monte de Castro, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Aspicilia myrinii (Fr.) B. Stein

Acevo (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Aspicilia separans (Magnusson) Clauz.

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985).

BACIDIA de Not. (1846)*Bacidia arceutina* (Ach.) Arnold

Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983).

Bacidia friesiana (Hepp) Körber

Carballeira no Regueiro de Pereira, As Cavadás, Cañás (CRESPO *et al.*, 1981).

Bacidia inundata (Fr.) Körber

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.

Cangas, Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. atrogrisea* ?Arnold?), preto a Central de Meirama (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr.

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Vilaboa (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

Bacidia phacodes Körber

Regueiro de Reboredo, Regueiro Balado, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Monte da Arca Aberta, Casas de Borducedo Grande, río Beduido (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körber

A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. acerina* ?Arnold?).

Bacidia populorum (Massal.) Trevisan

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Bacidia rubella (Hoffm.) Massal.

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Aquela Banda, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a, 1987b).

Bacidia sabuletorum (Schreber) Lettau

A Seca, Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. sabuletorum* Lettau).

Bacidia subfuscæ (Arnold) Clauz. & Roux

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

BAEOMYCES Pers. (1794)*Baeomyces fuscorufescens* Vainio

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Baeomyces roseus* Pers.**

Preto de Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Mourente (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Tubercularia ericetorum* Weber), Cerredo (PÉREZ *et al.*, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Baeomyces rufus* (Huds.) Rebent.**

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Tubercularia rufa* O. Kze.), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Carracedo (PÉREZ *et al.*, 1991).

BIATORA* Fr. (1817)**Biatora carneoalbida* (Müll. Arg.) Coppins**

A Ribeira Grande [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992, como *Bacidia c.* (Müll. Arg.) Coppins].

***Biatora sphaeroides* (Dickson) Körber**

Carballeira no Regueiro de Pereira, Monte da Arca Aberta [CRESPO *et al.*, 1981, como *Catillaria s.* (Dickson) Schuler].

***Biatora vernalis* (L.) Fr.**

Preto a Central de Meirama [CRESPO *et al.*, 1981, como *Lecidea v.* (L.) Ach.], Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

BRYORIA* Brodo & D. Hawksw. (1977)**Bryoria chalybeiformis* (L.) Brodo & D. Hawksw.**

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Bryoria fuscescens* (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.**

Pena (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

BUELLIA* de Not. (1846)**Buellia aethalea* (Ach.) Th. Fr.**

Monte de Castro, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Catoira, Pedra do Lagarto [SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. verruculosa* (Sm.) Mudd].

***Buellia anomala* Zahlbr.**

Cambre (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Buellia badia* (Fr.) Massal.**

Monte da Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Monte do Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Buellia coniops* (Wahlenb. ex Ach.) Th. Fr.**

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987, citada como conferible).

***Buellia disciformis* (Fr.) Mudd**

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. parasema* ¿Körber?), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Gaxate-Berdudido (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo, Fornelos de Montes (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Bajada a arroyo Xiestas (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Buellia erubescens* Arnold**

Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), pista de Seoane a Visuña (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

***Buellia glaucoatra* (Nyl.) Clauz.**

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Buellia griseovirens* (Turner & Borrer ex Sm.) Almb.**

Porto do Canizo (BARRENO & VÁZQUEZ, 1981), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES,

1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991).

Buellia hyperbolica Bagl.

De Seoane a Visuña, Eiriz (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

Buellia italicica Massal.

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. lactea* Körber).

Buellia jorgei G. Samp.

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Aranza (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Aranza, Campelo, O Couso, Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso, Ventín de Arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993). Algunos autores no la consideran distinta de *B. erubescens*. La diferencia más acusada entre ambos taxones está en las esporas que en *B. jorgei*, presentan forma arriñonada, mientras que en *B. erubescens* son rectas.

Buellia leptoclinoides (Nyl.) Steiner

Corrubedo [EGEA, 1989, in *Hafellia l.* (Nyl.) Scheidegger & Mayrhofer in Kalb].

Buellia occulta (Körber) Sheard

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Buellia polyporella (Nyl.) Arnold

Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Buellia punctata (Hoffm.) Massal.

Pedra do Lagarto, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *B. punctiformis* ¿Arnold?), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

Buellia schaeereri de Not.

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a).

Buellia sororia Th. Fr.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Buellia stellulata (Taylor) Mudd

Corrubedo, Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Buellia subdisciformis (Leighton) Vainio

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

BYSSOLOMA Trevisan (1953)

Byssoloma leucoblepharum (Nyl.) Vainio

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

Byssoloma marginatum (Arnold) Sérusiaux

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

CALICIUM Pers. (1794)

Calicium abietinum Pers.

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE

SILANES & CARBALLAL, 1987), Cortes (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Calicium glauceum Ach.

San Martín de Suarna (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

Calicium hyperelloides Nyl.

Queixas (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Calicium quercinum Pers.

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889).

CALOPLACA Th. Fr. (1860)

Caloplaca aractina (Fr.) Häyren

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

Caloplaca atroflava (Turner) Monguillon

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Blastenia ferruginea* Körber var. *obscura* Th. Fr.).

Caloplaca aurantia (Pers.) Steiner

Catoira, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Amphiloma aurantium* Müll.), Punta do Cabalo (ARDRÉ, 1957), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ría de Camariñas (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1963).

Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.

Mollabao, A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927), preto a Central de Meirama (CRESPO *et al.*, 1981), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990b), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a, 1992a), pista de Seoane a Visuña (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.

Punta do Cabalo, Punta de Rande (ARDRÉ, 1957), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Caloplaca crenularia (With.) Laundon

Fisterra, Corrubedo [BAHILLO *et al.*, 1987, como *C. festiva* (Ach.) Zwackh], A Pobra de Burón [PÉREZ *et al.*, 1991, como *C. festiva* (Ach.) Zwackh].

Caloplaca crenularia (With.) Laundon var. *metabasis* Massal.

Monte do Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992; SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.

Preto de Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Lecanoraf. i* Nyl.?), A Caeira, Pedra do Lagarto, A Seca, Monte da Fracha, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Blastenia f. Körber*), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Campelo, Fornelos de Montes (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. var. *hungarica* (Magnusson) Clauz. & Roux

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989, como *C. hungarica* Magnusson), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

Caloplaca flavorubescens (Huds.) Laundon

Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Xanthocarpia aurantiaca* ?G. Samp.?).

***Caloplaca holocarpa* (Hoffm.) Wade**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), A Coruña (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989; CARBALLAL *et al.*, 1990), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), San Pedro (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

***Caloplaca littorea* Tavares**

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Caloplaca marina* (Wedd.) Zahlbr. ex Du Rietz**

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Amphiloma lobulatum* G. Samp.), Punta do Cabalo, Punta de Rande, Punta da Congorza, Punta Corveiro dos Castros (ARDRÉ, 1957), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ría de Camariñas (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1963), Costa de Camelle (PÉREZ-CIRERA & MALDONADO, 1982), San Vicente (EGEA, 1984), Ría de Lires (PÉREZ-CIRERA & PACHECO, 1985), Boiro, Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Caloplaca obscurella* (Lahm ex Körber) Th. Fr.**

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985).

***Caloplaca pollinii* (Massal.) Jatta**

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Blastenia p.* Massal.).

***Caloplaca saxicola* (Hoffm.) Nordin**

Preto de Redondela (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Placodium murorum* DC. var. *citrinum* Nyl.).

***Caloplaca scopularis* (Nyl.) Lettau**

Fisterra, Illas Sisargas (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Caloplaca subpallida* Magnusson**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Caloplaca teicholyta* (Ach.) Steiner**

Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Blastenia t.* Körber).

***Caloplaca thallincola* (Wedd.) D. R.**

San Vicente (EGEA, 1984).

***Caloplaca vitellinula* (Nyl.) H. Olivier**

Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Xanthocarpia v.* G. Samp.), Fisterra, Boiro (BAHILLO *et al.*, 1987).

CANDELARIA Massal. (1852)***Candelaria concolor* (Dickson) B. Stein**

Preto de Padrón, Caldas de Reis (Leg. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia candelaria* Nyl.), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990b), Fene, Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Ferrol, Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

CANDELARIELLA Müll. Arg. (1894)***Candelariella aurella* (Hoffm.) Zahlbr.**

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

***Candelariella coralliza* (Nyl.) Magnusson**

Peña da Moura (ETAYO *et al.*, 1991). Algunos autores la consideran como una variedad de *C. vitellina*.

***Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau**

Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Candelariella vitellina* (Hoffm.) Müll. Arg.**

A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Patellaria v.* Hoffm.), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Fene, Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pico de Costoia (CARBALLAL *et al.*, 1991), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), O Rocín (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), Ferrol, Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Candelariella vitellina* var. *pulvinata* (Malbr.) Mereschk.**

Parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau**

Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

CARBONEA* (Hertel) Hertel (1983)**Carbonea vitellinaria* (Nyl.) Hertel**

Barbeitos (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

***Carbonea vorticosa* (Flörke) Hertel**

Pena Trevinca [CARBALLAL *et al.*, 1985, como *Lecidea v.* (Flörke) Körber], Montouto (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

CATAPYRENIUM* Flotow (1850)**Catapyrenium lachneum* (Ach.) R. Sant.**

Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Endopyrenium hepaticum* Körber).

***Catapyrenium rufescens* (Ach.) Breuss**

Preto de Vigo, Coruña, Ferrol (Leg. L Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Endocarpon r.* Ach.).

CATILLARIA* Massal. (1852)**Catillaria atomariooides* (Müll. Arg.) Kilias**

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Catillaria atropurpurea* (Schaerer) Th. Fr.**

Couto de Couso [CRESPO *et al.*, 1983, como *C. atropurpurea* (Schaerer) Vezda & Poelt].

***Catillaria chalybeia* (Borrer) Massal.**

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. melastigma* G. Samp.), preto a Central de Meirama, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Regueiro Valado (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Catillaria chalybeia* var. *chloropoliza* (Nyl.) Kilias**

Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Catillaria erysiboides* (Nyl.) Th. Fr.**

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

***Catillaria laureri* Hepp ex Th. Fr.**

Corga da Aguacenza [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992, como *Catinaria l.* (Hepp ex Th. Fr.) Degel.].

***Catillaria lenticularis* (Ach.) Th. Fr.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Catillaria nigroclavata* (Nyl.) Schuler**

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Pontevedra (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

CETRARIA* Ach. (1803)**Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
[= *Tuckermannopsis c.* (Willd.) Hale]**

Castiñeira, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Vilanova de Arousa (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Monte do Porte, A Capela (ETAYO *et al.*, 1991), Alto do Boi, Pacios (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

***Cetraria ericetorum* Opiz**

A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Cetraria islandica* (L.) Ach.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Physcia i.* DC.?), preto de Tui (Leg. R. Bust.), Pontevedra, Ourense (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Queixada (CARBALLAL *et al.*, 1985).

***Cetraria sepincola* (Ehrh.) Ach.**

Preto de Lugo (AMO Y MORA, 1870), preto de Lugo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Platysma saepincolum* Hoffm.).

CETRELIA* Culb. & C. Culb. (1968)**Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & C. Culb.**

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Parmelia o.* Nyl.), Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

CHAENOTHECA* (Th. Fr.) Th. Fr. (1860)**Chaenotheca furfuracea* (L.) Tibell**

Preto de Mondoñedo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Coniocybe f.* Ach.).

***Chaenotheca hispidula* (Ach.) Zahlbr.**

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

***Chaenotheca stemonea* (Ach.) Müll. Arg.**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

CHIODECTON* Ach. (1814)**Chiodecton myrticola* Fée**

Tierras de Ulla, Vigo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889).

CHRYSOTRIX* Mont. (1852)**Chrysotrichia candelaris* (L.) Laundon**

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lepraria c.* ?G. Samp.?), Couto de Couso [CRESPO *et al.*, 1983, como *Lepraria c.* (L.) Fr.], Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Aranza (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

CLADONIA* Hill ex Browne (1756)**Cladonia arbuscula* (Wallr.) Flotow**

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cladina sylvatica* L. ?var. *silvestris* Oed.?), Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. sylvatica* Hoffm.), Monte Castelo (ABBAYES, 1945, como *C. sylvatica* Hoffm.), Brins [CRESPO *et al.*, 1983, como *Cladina arbuscula* (Wallr.) Hale & Culb.].

***Cladonia bellidiflora* (Ach.) Schrader**

Monte do Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Cladonia caespiticia* (Pers.) Flörke**

Palas de Rei (SEIJAS, 1952), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Cladonia cenotea* (Ach.) Schaerer**

Lourido (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. cenotea* (Ach.) Schaer. var. *glauca* Leighton.)

***Cladonia cervicornis* (Ach.) Flotow**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), A Fonsagrada [VALCÁRCEL *et al.*, 1991, como *C. cervicornis* ssp. *pulvinata* (Sandst.) Ach.].

Cladonia cervicornis* spp. *cervicornis

Monte Galíñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. verticillata* Hoffm. r. *cervicornis* (G. Samp.?).

***Cladonia cervicornis* ssp. *verticillata* (Hoffm.) Ahti**

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce verticillata* Hoffm.), Pontevedra [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, como *C. verticillata* (Hoffm.) Schaeerer], A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia chlorophaea* (Flörke ex Sommerf.) Sprengel**

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce pyxidata* L. var. *chlorophaea* Flörke), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991, como *C. chlorophaea* (Flörke ex Sommerf.) Sprengel y como *C. merochlorophaea* Asah. var. *merochlorophaea*), Xora, Igrexafeita, Lanzós, Curro de Caudoso (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Anceu, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991, como *C. cryptochlorophaea* Asah.), O Couso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), O Couso, Pazos

de Borbén, Gaxate-Berdudo, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992, como *C. cryptochlorophaea* Asah.), Gaxate-Verducido, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1991, como *C. merochlorophaea* Asah.), O Couso, Gaxate-Verducido (BAHILLO & CARBALLAL, 1992, como *C. merochlorophaea* Asah.).

***Cladonia ciliata* Stirton**

[= *Cladina c.* (Stirton) Trass]

Brins (CRESPO *et al.*, 1983), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia ciliata* f. *tenuis* (Flörke) Ahti**

A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia coccifera* (L.) Willd.**

Lugo [LANGE, 1860, como *C. cornucopoides* (L.) Fr.], Comarca de Compostela (TEXIDOR, 1869, como *Cenomyce c.* ?Ach.?), Galicia (Leg. Camiña), Lugo (Leg. Lange), Tui (Leg. L. Seoane), Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889, como *C. cornucopoides* Fr.), Galicia (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce c.* L.), Pedra do Lagarto, Monte Galíñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Altos da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Cladonia coniocraea* auct.**

Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemill, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Cañas [CRESPO *et al.*, 1981, como *C. coniocraea* (Flörke) Sprengel], A Guía [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b, como *C. coniocraea* (Flörke) Sprengel].

***Cladonia conista* A. W. Evans**

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia convoluta* (Lam.) Cout.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Cenomyce endiviaefolia* Ach.), Rubiás (Leg. Colmeiro)

(COLMEIRO, 1889, como *C. endiviaefolia* Fr.), A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. foliacea* Willd. r. *convoluta* ?G. Samp.?).

***Cladonia cornuta* (L.) Hoffm.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Cenomyce c. Ach.*), Tui (TEXIDOR, 1869, como *Cenomyce c. Ach.*), Rubiás (Leg. Colmeiro), Tui, Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889, como *C. fimbriata* Fr. var. *radiata* Fr.).

***Cladonia crispata* (Delise) Vainio**

Monte Castelo (ABBAYES, 1945, como *C. crispata* var. *gracilescens* Vainio), Brins [CRESPO et al., 1983, como *C. crispata* (Ach.) Flotow], Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. crispata* Flotow)

***Cladonia decorticata* (Flörke) Sprengel**

Galicia (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce d. Flörke*).

***Cladonia deformis* (L.) Hoffm.**

A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia digitata* (L.) Hoffm.**

Galicia (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce d. Schaeerer*), Carteire (SEIJAS, 1952), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Xora, Cospeito, Lanzós (CARBALLAL et al., 1991b).

***Cladonia fimbriata* (L.) Fr.**

Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889, como *C. fimbriata* Fr. var. *tubaeformis* Fr.), A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce f. L. var. prolifera* Retz.), A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Casas de Borducedo Grande, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Regueiro de Reboredo (CRESPO et al., 1981), A Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988).

***Cladonia firma* (Nyl.) Nyl.**

Pena da Moura (ETAYO et al., 1991).

***Cladonia floerkeana* (Fr.) Flörke**

Lourido, Monte da Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Brins (CRESPO et al., 1983), Pena da Moura (ETAYO et al., 1991), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia foliacea* (Huds.) Willd.**

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce f. Huds. var. alcicornis* Lghf.), proximidades de Cuntis, Monte Xesteiras, Cuntis (CARBALLAL et al., 1991a), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia furcata* (Huds.) Schrader**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Cenomyce f. Ach.*), Rubiás (Leg. Colmeiro), Pedrafita, Lugo, Santiago de Compostela (Leg. Texidor), Ourense (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Coruña (LÁZARO-IBIZA, 1898), Monte da Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Carteire (SEIJAS, 1952), río Deo (DALDA, 1972, como *C. furcata* Ach.), Brins (CRESPO et al., 1983), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Monte Xesteiras, Monte Alegre (CARBALLAL et al., 1991a).

***Cladonia furcata* var. *palamaea* (Ach.) Nyl.**

Picos de Acares (NAVÁS, 1904, como *C. furcata* Huds. var. *palamaea* Ach.), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia furcata* var. *pinnata* (Flörke) Vainio**

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *C. furcata* Huds. var. *pinnata* Flörke).

***Cladonia furcata* var. *racemosa* (Hoffm.) Flörke**

Preto de Padrón (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Guarda (NAVÁS, 1904, como *C. furcata* Huds. var. *racemosa* Hoffm.), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia glauca* Flörke**

Pazos de Borbén (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

***Cladonia gracilis* (L.) Willd.**

Lugo, Pico Sacro [LANGE, 1860, como *C. gracilis* L. (Fr.) ?var. *cervicornis* (Ach.)?], preto de Vigo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *C. gracilis* ?Fr.?), Pico Sacro (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889), Galicia (Leg. Lange, Camiña) (COLMEIRO, 1889, como *C. gracilis* Fr. var. *elongata* Ach.), preto de Lugo, Pico Sacro (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *C. gracilis* Fr. ?var. *cervicornis* Schaerer?), Pico de Ancares (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce* g. L.), río Deo (DALDA, 1972), Monte do Piñor (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Cladonia gracilis* var. *aspera* Flörke**

Pico Sacro (Leg. Lange) (LANGE, 1860; COLMEIRO, 1889), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia gracilis* var. *chordalis* (Flörke) Schaerer**

A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia humilis* (With.) Laundon**

San Amaro (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Ventín-Broullosa (BAHILLO & CARBALLAL, 1991; BAHILLO & CARBALLAL, 1992), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991, como *C. conoidea* Ahti).

***Cladonia macilenta* Hoffm.**

Río Deo (DALDA, 1972, como *C. macilenta* Körber), Portocelo, Marín, A Caeira, Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), Pontevedra (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991), Freaza (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Cladonia macrophylla* (Schaerer) Stenhammar**

Picos de Ancares (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce alpicola* Flotow).

***Cladonia mediterranea* Duvign. & des Abb.
[= *Cladina m.* (Duvign. & des Abb.) Follm. & Hern.-Padr.]**

Brins (CRESPO *et al.*, 1983), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia metacorallifera* Asah. var. *reagens* Asah.**

A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

***Cladonia mitis* Sandst.**

Areal de Cabanas, As Achas (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Fonsagrada [VALCÁRCEL *et al.*, 1991, como *Cladina m.* (Sandst.) Hustich].

***Cladonia ochrochlora* Flörke**

Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978, como *C. coniocraea* auct.), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, como *C. coniocraea* auct.), Xora, Taboada, A Hermida, Cospeito, Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991, como *C. coniocraea* auct.), Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso, Freaza, Ventín-Broullosa (BAHILLO & CARBALLAL, 1992, como *C. coniocraea* auct.).

***Cladonia parasitica* (Hoffm.) Hoffm.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Cladonia peziziformis* (With.) Laundon**

Ventín-Broullosa (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

***Cladonia polycarpooides* Nyl.**

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Cladonia polydactyla* (Flörke) Sprengel**

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce flabelliformis* Flörke), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia portentosa* (Dufour) Coem.**

[= *Cladina p.* (Dufour) Follm.]

Brins (CRESPO et al., 1983), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia pyxidata* (L.) Hoffm.**

Vigo, Tui, Pedrafita (TEXIDOR, 1869, como *Cenomyce p.* Ach.), Galicia (Leg. Lange), Santiago de Compostela (Leg. Colmeiro, Texidor), Pontevedra, Vigo, Tui (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889), A Coruña, Baiona (LÁZARO-IBIZA, 1898), A Guarda (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce fimbriata* L. var. *simplex* Weis.), Lourido, A Caeira, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Carteire (SEIJAS, 1952), río Deo (DALDA, 1972, como *C. pyxidata* Ach.), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Cuntis, Monte Xesteiras, Monte da Fracha (CARBALLAL et al., 1991a), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Cladonia ramulosa* (With.) Laundon**

[= *C. anomaea* (Ach.) Ahti & P. James]

Anllo (CARBALLAL et al., 1991a), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Cladonia rangiferina* (L.) Weber ex Wigg.**

Lugo [LANGE, 1860, como *Cladina r.* (L.) Nyl.], Galicia [NAVÁS, 1904, como *Cladina rangiferina* (L.) Nyl.], Galicia (Leg. Camiña), Lugo (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *C. rangiferina* Hoffm.), Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *C. rangiferina* Hoffm. var. *sylvatica* Schaeerer), A Coruña (LÁZARO-IBIZA, 1898), río Deo (DALDA, 1972, como *C. rangiferina* Ach.).

***Cladonia rangiformis* Hoffm.**

Areal de Cabanas, O Carballiño, Cabalo Blanco (CARBALLAL et al., 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991).

***Cladonia rangiformis* f. *foliosa* Flörke**

Mondariz (NAVÁS, 1904).

***Cladonia rangiformis* var. *muricata* (Delise) Arnold**

A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia rangiformis* var. *pungens* (Ach.) Vainio**

A Guarda (NAVÁS, 1904), Monte del Castro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. rangiformis* Hoffm. f. *pungens* Vainio), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm.**

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Anllo (CARBALLAL et al., 1991a), Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso, San Amaro (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

***Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm. var. *subsquamosa* (Nyl. ex Leighton) Vainio**

Galicia (NAVÁS, 1904, como *C. subsquamosa* Nyl.), entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral (CRESPO et al., 1981), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

***Cladonia stellaris* (Opiz) Pouzar & Vezda**

A Fonsagrada [VALCÁRCEL et al., 1991, como *Cladina s.* (Opiz) Brodo].

***Cladonia strepsilis* (Ach.) Vainio**

A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1991).

Cladonia subcervicornis (Vainio) Kernst.

Brins (CRESPO *et al.*, 1983), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

Cladonia subulata (L.) Weber ex Wigg.

Galicia (NAVÁS, 1904, como *Cenomyce fimbriata* L. var. *cornutoradiata* Coem.), Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *C. fimbriata* Fr. var. *subulata* Vainio), Brins (CRESPO *et al.*, 1983), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

Cladonia uncialis (L.) Weber ex Wigg.

Comarca Compostelana (TEXIDOR, 1869, como *Cenomyce u. Ach. var. cladonioides* y como *Cenomyce u. Ach. var. leprosa* Delib.), preto de Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889), Monte de Castro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), altos da Aguasenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991).

Cladonia uncialis (L.) Weber ex Wigg. ssp. *biuncialis* (Hoffm.) M. Choisy

A Guarda (NAVÁS, 1904, como *C. uncialis* L. var. *dichraea* Ach.), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

Cladonia zoppii Vainio

Monte Ames, Lagoa de Antela (ABBAYES, 1945, como *C. distracta* Nyl.), Brins (CRESPO *et al.*, 1983), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1991).

CLIOSTOMUM Fr. (1825)

Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr.

[= *C. graniforme* (Hagen) Coppins]

Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988).

COELOCAULON Link (1833)

Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link

Lugo [LANGE, 1860, como *Cetraria aculeata* (Ehrh.) Fr.], preto de Lugo (Leg. Lange)

(COLMEIRO, 1889, como *Cetraria aculeata* Fr.), Monte Galiñeiro [SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Cetraria aculeata* (Schreber) Fr.], Cuntis, O Carballiño, Cabalo Branco (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Campo da Cruz (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link subsp. *hispidum* (Crombie) D. Hawksw.

Brins (CRESPO *et al.*, 1983, como *C. hispidum*), Acevo (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Coelocaulon crespoae Barreno & Vázquez

Porto do Canizo (BARRENO & VAZQUEZ, 1981), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

COLLEMA Weber ex Wigg. (1780)

Collema auriforme (With.) Coppins & Laundon

Regueiro de Reboreda, Carballeira de Antemil, de Ordes a Carral (CRESPO *et al.*, 1981, como *C. auriculatum* Hoffm.).

Collema cristatum (L.) Weber ex Wigg.

Montes de Lóuzara (CARBALLAL *et al.*, 1985).

Collema fasciculare (L.) Weber ex Wigg.

Orillas del río Baldeiras (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Collema flaccidum (Ach.) Ach.

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lethagrium f. S. F. Gray*), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Moreda, Pacios (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Collema fragans (Sm.) Ach.

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a).

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz

Dena, Marcón (Leg. Crespi) (DEGELIUS, 1954), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES &

CARBALLAL, 1989; LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Andrade, As Achas (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Collema nigrescens* (Huds.) DC.**

Preto de Ourense (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889), Dena, Pedra do Lagarto, A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lethagrium n. S. F. Gray*), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989, citado como conferible; LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989, citado como conferible), Monte Lobeira, Ourense, areal de Cabanas (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

***Collema subflaccidum* Degel.**

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Casa Grande (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Altos da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES 1991), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a, 1992a), pista de Seoane a Visuña (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

***Collema subnigrescens* Degel. f. *caesium* (Clem.) Degel.**

Dena, Redondela (Leg. Crespi) (DEGELIUS, 1954).

***Collema undulatum* Laurer ex Flotow.**

A Capela (ETAYO *et al.*, 1991).

CORNICULARIA (Schreber) Hoffm. (1794)

***Cornicularia normoerica* (Gunn.) Du Rietz**

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985).

CRESPONEA Egea & Torrente (1993)

***Cresponea premnea* (Ach.) Egea & Torrente var. *premnea*
[= *Lecanactis p.* (Ach.) Arnold]**

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985; CASARES, 1986), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Santiago de Compostela, Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Carballeira de San Lorenzo, Vigo (EGEA & TORRENTE, 1993).

***Cresponea premnea* var. *saxicola* (Leight.) Egea & Torrente**

[= *Lecanactis p.* var. *saxicola* (Leightf.) H. Olivier].

Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1989; LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a; EGEA & TORRENTE, 1993).

CYPHELIUM Ach. (1815)

***Cyphelium sessile* (Pers.) Trevisan**

Monasterio de Armenteira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Belesar (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

DEGELIA Arvidsson & D. Galloway (1981)

***Degelia atlantica* (Degel.) P. M. Jørg. & P. James**

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Parmeliella p.* Vain. var. *myriocarpa* Zahlbr.).

***Degelia plumbea* (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James**

[= *Parmeliella p.* (Lightf.) Vainio]

Pontevedra (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Pannaria p.* ¿Delise?), Chapela (DEGELIUS, 1935), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), de Folgoso a la Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Naraxa, Retorta (PÉREZ *et al.*, 1991).

DENDRISCOCAULON Nyl. 1885

***Dendriscocaulon umhausense* (Auersw.) Degel.**

Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL,

1991a), O Couso, Ventín-Broullosa (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992), Mangüero (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

DERMATOCARPON Eschw. (1824)

Dermatocarpon luridum (With.) Laundon

Inmediaciones de Cuntis (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Endocarpon fluviatile* DC.?), Merza [CARBALLAL *et al.*, 1985, como *D. weberi* (Ach.) Mann.], Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), río Vilaframil [PÉREZ *et al.*, 1991, como *D. weberi* (Ach.) Mann. var. *weberi* (Ach.) Mann.].

Dermatocarpon luridum var. *decipiens* (Massal.) Vainio

Caaveiro [CARBALLAL *et al.*, 1985, como *D. decipiens* (Massal.) DT. & Sarnth.], Vilarín de Abaixo [VALCÁRCEL *et al.*, 1992, como *D. weberi* (Ach.) Mann var. *decipiens* (Massal.) Vainio].

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *D. miniatum* Th. Fr.), Corrubedo, Xallas (BAHILLO *et al.*, 1987).

Dermatocarpon miniatum var. *papillosum* Müll. Arg.

Monte Castelo (ABBAYES, 1945).

DIMERELLA Trevisan (1880)

Dimerella lutea (Dickson) Trevisan

Monte da Arca Aberta, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, río Beduido (CRESPO *et al.*, 1981), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Porto da Gañidoira (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

Dimerella pineti (Ach.) Vezda [= *D. diluta* (Pers.) Trevisan]

Portocelo, Lourizán, Ponte Condesa, Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Dimerella tavaresiana Vezda

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

DIPLOICIA Massal. (1852)

Diploicia canescens (Dickson) Massal.

Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Corrubedo (EGEA, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

DIPLOSCHISTES Norman (1853)

Diploschistes actinostomus (Pers. ex Ach.) Zahlbr. var. *caesioplumbeus* (Nyl.) Steiner

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Diploschistes caesioplumbeus (Nyl.) Vainio

Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987).

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

Froxán (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

Diploschistes scruposus (Schreber) Norman

Preto de Tui (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Urceolaria scruposa* Ach.), Zamáns (CARBALLAL *et al.*, 1985), Monte Alegre (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), A Fonsagrada

[VALCÁRCEL *et al.*, 1993, como *D. scruposus* subsp. *muscorum* (Scop.) Clauz. & Roux var. *muscorum*], Vilarín de Abaixo [VALCÁRCEL *et al.*, 1993, como *D. scruposus* subsp. *muscorum* (Scop.) Clauz. & Roux var. *parasiticus* (Sommerf.) Vainio].

DIRINA Fr. (1825)

Dirina insulana (Tavares) Tehler

Illa de Ons (EGEA, 1989).

Dirina massiliensis Durieu & Mont. f. *sorediata* (Müll. Arg.) Tehler

Corrubedo (EGEA, 1989).

EIGLERA Hafellner (1984)

Eiglera flavidia (Hepp) Hafellner

Serra do Muradal (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

ENDOCARPON Hedw. (1789)

Endocarpon adscendens (Anzi) Müll. Arg.

Borrón (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *E. pallidum* Ach.).

Endocarpon pusillum Hedw.

Estrada de Ourense, cerca de Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

ENTEROGRAPHA Fée (1824)

Enterographa crassa (DC.) Fée

Catoira, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), Santiago de Compostela, Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989).

Enterographa elaborata (Lyell ex Leighton) Coppins & P. James

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987; TORRENTE & EGEA, 1989).

Enterographa hutchinsiae (Leighton) Massal.

Mogor, Pedra do Lagarto, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *E. hutchinsiae* Koerb.), Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1989; LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Enterographa zonata (Körber) Källsten

Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1989).

EOPYRENULA R. C. Harris (1973)

Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris

Preto de Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Verrucaria farrea* Ach.).

EPHEBE Fr. (1825)

Ephebe lanata (L.) Vainio

Monte Castelo (ABBAYES, 1945), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

EVERNIA Ach. (1810)

Evernia prunastri (L.) Ach.

Galicia (Leg. Camiña), Tui (Leg. R. Bust.) (COLMEIRO, 1889), Pedra do Lagarto, Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Baamonde (ABBAYES, 1945), Lestedo (BELLOT, 1952), río Deo (DALDA, 1972), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Vilanova de Arousa (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Anceu, Aranza, Xesta, Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe,

Pazos de Borbén-Moscoso, Freaza, Ventín de Arriba (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

FELLHANERA Vezda (1986)

Fellhanera bouteillei (Desmaz.) Vezda

A Coruña [CARBALLAL *et al.*, 1990, como *Catillaria b.* (Desmaz.) Zahlbr.].

FULGENSIA Massal. & de Not. (1855)

Fulgensia fulgens (Swartz) Elenkin

(LÁZARO-IBIZA, 1898, como *Placodium f.* DC.)

Fulgensia fulgida (Nyl.) Szat.

A Rogueira (CARBALLAL *et al.*, 1985).

FUSCIDEA V. Wirth & Vezda (1972)

Fuscidea cyathoides (Ach.) V. Wirth & Vezda

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Lecidea rivulosa* Ach.), Corga da Aguacenza [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991, como *F. cyathoides* var. *corticola* (Fr.) Kalb], Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), San Martín de Suarna (VALCÁRCEL *et al.*, 1992), A Fracha (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993), río Vilardongo [VALCÁRCEL *et al.*, 1993, como *F. cyathoides* var. *corticola* (Fr.) Kalb].

Fuscidea lightfootii (Sm.) Coppins & P. James

Regueiro de Reboredo, preto a Central Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, De Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Vigo, Parque de la Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a),

Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Aranza, Campelo, O Couso, Ventín de arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Fuscidea lygaea (Ach.) V. Wirth & Vezda

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea l.* Ach.), Peña da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

GRAPHINA Müll. Arg. (1880)

Graphina anguina (Mont.) Müll. Arg.

Xanceda (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

GRAPHIS Adans. (1763)

Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach.

Pontevedra, Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañás (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Louseiras, A Hermida, Parga (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), A Laxe, Sotomaior (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo, O Couso, Pazos de Borbén-Moscoso, Pazos de Borbén (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Queixas (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Graphis scripta (L.) Ach.

Cangas, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central Meirama, Carballeira

de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Rogueira, Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Aranza, Pazos de Borben-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Aranza, Campelo, O Couso, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

GYALECTA Ach. (1808)

Gyalecta flotowii Körber

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.

Pedra do Lagarto [SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Gyelecta cupularis* (Hedw.) Schaeerer].

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990, 1991a), Grañas, Xora, Igrexafeita (CARBALLAL *et al.*, 1991b).

GYALIDEA Lettau (1937)

Gyalidea fritzei (Stein) Vezda

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

GYALIDEOPSIS Vezda (1972)

Gyalideopsis anastomosans P. James & Vezda

Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991).

HAEMATOMMA Massal. (1852)

Haematomma leprariooides (Vainio) Vainio

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

Haematomma ochroleucum (Necker) Laundon

A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

HETERODERMIA Trevisan (1868)

Heterodermia leucomelos (L.) Poelt

Preto de Pontes de García Rodríguez (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia leucomelas* Mich.), A Coruña (LÁZARO-IBIZA, 1898, como *Physcia leucomela* ?Duby.?), Carballeira de Antemil (CRESPO *et al.*, 1981), Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevisan

Rubiás (Leg. Colmeiro), Padrón (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia o.* Nyl.), Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992; BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Heterodermia propagulifera (Vainio) Day

Entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981).

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevisan

Orillas del río Baldeiras (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

HYMENELIA Krempelh. (1852)

Hymenelia lacustris (With.) Poelt & Vezda

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

HYPERRHYSCIA Müll. Arg. (1894)

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrh. & Poelt

[= *Physciopsis a.* (Flörke) M. Choisy]

A Seca, A Parda [SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Physcia elaeina* (Sm.) A. L. Sm.], Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL

& GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Ferrol, Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

HYPOCENOMYCE M. Choisy (1951)

Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Liljeblad) M. Choisy

Pista de Seoane a Visuña, de Folgoso a La Pendella, Eiriz (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b).

HYPOGYMNIA (Nyl.) Nyl. (1896)

Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Räsänen

Santa Eufemia (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Parmelia p.* Ach.), Galicia (Leg. Quer), Cuntis, Caldas de Reis (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Parmeliap.* Ach.), A Guarda, Mondariz (NAVÁS, 1901, como *Parmelia p.* var. *platyphylla* Ach.), A Guarda, Mondariz (NAVÁS, 1901, como *Parmeliap.* var. *labrosa* Ach.), Redondela, Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Couto de Couso [CRESPO *et al.*, 1983, como *H. physodes* (L.) Nyl. var. *labrosa* Ach.], Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Campelo, Gaxate-Berdrido, Pazos de Borbén-Moscoso, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Hypogymnia tubulosa* (Schaerer) Havaas**

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *H. tubulosa* G. Samp.), entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Louseiras, Cospeito, Belesar, Parga (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Campelo, O Couso, Gaxate-Berdrido, Pazos de Borbén-Moscoso, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Hypogymnia vittata* (Ach.) Parr.**

A Guarda, Mondariz (NAVÁS, 1901, como *Parmelia physodes* Ach. var. *v.* Ach.).

IMSHAUGIA S. Meyer (1985)

Imshaugia aleurites (Ach.) S. Meyer

De Folgoso a Pendella, Eiriz [ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b, como *Parmeliopsis a.* (Ach.) Nyl.].

JAPEWIA Tønsb. (1990)

Japewia carrollii (Coppins & P. James) Tønsb. (= *Lecidea c.* Coppins & P. James)

Entre Xermiñas e Agromaior, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado (CRESPO *et al.*, 1981), Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991) Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Campelo, Pazos de Borbén-Moscoso, Ventín de Arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

LASALLIA Mérat (1821)

Lasallia hispanica (Frey) Sancho & Crespo

Os Ancares (CODOGNO & SANCHO, 1991), Serra del Muradal (PÉREZ *et al.*, 1991), A Lama (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Lasallia pustulata (L.) Mérat

[= *Umbilicaria p.* (L.) Hoffm.]

Galicia (Herb. Madrid), Cuntis, Caldas de Reis (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Becerreá (BELLOT, 1952), río Deo (DALDA, 1972), Fisterra, Illas Sisargas (BAHILLO *et al.*, 1987), Cuntis, Monte Alegre (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

LAUDERLINDSAYA J. C. David & D.

Hawksw. (1989)

Lauderlindsaya chlorococca (Leighton)

Diederich & Sérusiaux

Carballeira de Antemil [CRESPO *et al.*, 1981, como *Sphaerulina c.* (Leighton) R. Sant.].

LECANACTIS Fr. (1825)

Lecanactis grumulosa (Dufour) Fr. var. *monstrosa* (Bagl.) Egea & Torrente

Corrubedo (EGEA, 1989).

Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold

[= *Lepraria l.* (Ach.) Ach.]

Ponte Condesa, Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990, como *L. latebrarum* Ozenda & Clauz.), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b, como *L. latebrarum* Ozenda & Clauz.), Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992, como *L. latebrarum* Ozenda & Clauz.), Cambre (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993, como *L. latebrarum* Ozenda & Clauz.).

LECANIA Massal. (1853)

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.

Mollabao (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Lecania erysibe (Ach.) Mudd

Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Lecania fuscella (Schaerer) Körber

A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927 como *L. syringea* Th. Fr.), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

Lecania spadicea (Flotow) Zahlbr.

Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Solenopsora olivacea* Samp. var. *s.* G. Samp.?).

LECANORA Ach. (1810)

Lecanora actophila Wedd.

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. quartzina* Nyl.), Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. & Rostrup

Catoira, A Caeira, Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. galactina* Ach.), Boiro (BAHILLO *et al.*, 1987).

Lecanora allophana (Ach.) Nyl.

A Guarda, Mondariz [NAVÁS, 1903, como *L. subfuscata* Ach. (nomem dubium)], A Parda, Cangas, Dena, Pontevedra, O Grove, A Seca, Redondela, Pedra do Lagarto, Vigo [SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. subfuscata* Ach. (nomem dubium)], Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Xanceda (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Lecanora argentata (Ach.) Malme

Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977, como *L. subfuscata* Magnusson), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro

(LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Lecanora campestris (Schaerer) Hue

Pontevedra, Pedra do Lagarto, A Seca, A Caeira, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. campestris* B. de Lesd.), San Cristobo (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Lecanora carpinea (L.) Vainio

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991).

Lecanora chlarotera Nyl.

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Monte do Dono, Castiñeira (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian, Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Aranza, Campelo, A Laxe, Sotomayor, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Aranza, Campelo, O Couso, Pazos de Borbén, Ventín de Arriba, Fornelos do Monte (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Campelo [BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993, como *L. chlarotera* Nyl. f. *rugosella* (Zahlbr.) Poelt].

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Monte do Castro, Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b).

Lecanora dispersa (L.) Sommerf.

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. dispersa* Nyl.), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, como *L. gr. dispersa*), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, como *L. gr. dispersa*), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Lecanora expallens Ach.

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. conizaea* Nyl.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Queixas (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Lecanora gangaleoides Nyl.

Monte Galiñeiro, A Fracha, A Caeira, Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), Buisán (VALCÁRCEL *et al.*, 1992), parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Lecanora glabrata (Ach.) Malme

A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Lecanora glaucolutescens Nyl.

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Lecanora hagenii* (Ach.) Ach.**

Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992, como *L. gr. hagenii*), Ferrol, Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Lecanora helicopis* (Wahlenb.) Ach.**

Fisterra, Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Lecanora horiza* (Ach.) Lindsay**

Xanceda (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Lecanora impudens* Degel.**

Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Xanceda (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh.**

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. intumescens* Köerb.), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989; LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Lecanora jamesii* Laundon**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

***Lecanora laatokkaensis* (Räsänen) Poelt**

Acevo (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

***Lecanora laevis* Poelt**

(= *L. sienae* B. de Lesd.)

Cañas (CRESPO *et al.*, 1981, como *L. sienae* ¿des Abb.?), Monte do Castro, Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988),

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Lecanora lecideoides* (Nyl.) Harm.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Lecanora leptyrodes* (Nyl.) Degel.**

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

***Lecanora meridionalis* Magnusson**

Regueiro de Reboreda, preto a Central de Meirama (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985).

***Lecanora muralis* (Schreber) Rabenh.**

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Squamaria saxicola* Nyl.), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Psoroma murale* G. Samp.), A Fonsagrada (PÉREZ *et al.*, 1991), parte alta a la subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Lecanora nitens* (Pers.) Ach.**

Monte Galiñeiro, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

***Lecanora orosthea* (Ach.) Ach.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Lecanora pallida* (Schreber) Rabenh.**

A Fracha, Redondela, Cangas, Catoira, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. pallida* Schaer.), Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian, Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL &

LÓPEZ DE SILANES, 1985), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Monte do Piñor (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Aranza, Sotomayor, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Aranza, Campelo, O Couso, Fornelos do Monte, Pazos de Borbén, Ventín de Arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Lecanora polytropa* (Hoffm.) Rabenh.**

Monte Galiñeiro, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. polytropa* Schaer.), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Montouto (VALCÁRCEL *et al.*, 1992), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Lecanora pulicaris* (Pers.) Ach.**

Ponte de Folgoso a Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992), Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991; BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Lecanora quercicola* Coppins & P. James**

Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

***Lecanora rupicola* (L.) Zahlbr.**

Preto de Caaveiro (Leg. L. Seoane) [COLMEIRO, 1889, como *L. glaucoma* (Hoffm.) Ach.], Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), A Pobra de Burón (PÉREZ *et al.*, 1991).

***Lecanora saligna* (Schrader) Zahlbr.**

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. effusa* Ach.).

***Lecanora saligna* var. *sarcopsis* (Ach.) Hillm.**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Lecanora sambuci* (Pers.) Nyl.**

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

***Lecanora strobilina* (Sprengel) Kieffer**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991b), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Pedreiras, Lanzós, Cospeito, Parga (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

***Lecanora subcarnea* (Liljeblad) Ach.**

Vilarín de Arriba (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

***Lecanora subrugosa* Nyl.**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), A Fonsagrada (PÉREZ *et al.*, 1991).

***Lecanora sulphurea* Ach.**

Cangas, Monte de A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Serra do Muradal (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

***Lecanora swartzii* (Ach.) Ach.**

Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

***Lecanora symmicta* (Ach.) Ach.**

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. symmictera* Nyl.), preto a Central de Meirama, Carballeira no Regueiro de Pereira, Castiñeira (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Aranza, Campelo, Pazos de Borbén, Ventín de Arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Fornos da Cal (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Lecanora umbrina* (Ach.) Massal.**

A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Lecanora varia* (Hoffm.) Ach.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama,

Carballeira no Regueiro de Pereira, Carballeira de Antemil, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Monte do Dono, Castiñeira, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), A Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b).

LECIDEA Ach. (1803)

Lecidea atroviridis (Arnold) Th. Fr.

Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991, como conferible).

Lecidea botryosa (Fr.) Th. Fr.

Preto a Central de Meirama, Monte da Arca Aberta (CRESPO *et al.*, 1981), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991, citada como conferible).

Lecidea confluens (Weber) Ach.

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985), Montouto (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Lecidea erythrophaea Flörke

Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Central do Eume, Porto da Gañidoira, A Hermida, Lanzós, Cospeito (CARBALLAL *et al.*, 1991b).

Lecidea exigua Chaub.

Dena, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. exigua* Schaer.), Regueiro de Reboredo, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES 1991), Campelo, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Lecidea fuliginosa Taylor

Subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Lecidea fuscoatra (L.) Ach.

Pedrado Lagarto, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *L. fuscoatra* Ach. var. *grisella* Nyl.).

Pena da Moura [ETAYO *et al.*, 1991, como *L. fuscoatra* (L.) Ach. var. *grisella* (Flörke) Nyl.], Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso [SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992, citada como *L. fuscoatra* var. *grisella* (Flörke) Nyl.].

Lecidea lactea Flörke ex Schaeerer

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985), Serra del Muradal (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Lecidea lapicida (Ach.) Ach.

Montouto (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Lecidea lithophila (Ach.) Ach.

A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992; SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Lecidea lurida (Ach.) DC.

Galicia (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1989, como *L. lurida* Ach.).

Lecidea obluridata Nyl.

Montouto (VALCÁRCEL *et al.*, 1992), Pigarzos (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Lecidea sarcogynoides Körber

Mogor, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Lecidea verrucariae (Metzl.) Nyl.

San Cristobo (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

LECIDELLA Körber (1855)

Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuckert

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

Lecidella anomalooides (Massal.) Hertel & Kilias

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea gonophila* Schaeerer), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Lecidella atrosanguinea Flörke

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea lithophila* Ach. var. *a*. Nyl.).

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

Preto de Lugo (Leg. L. Seoane (COLMEIRO, 1889, como *Lecidea parasema* Ach.), Pedra do Lagarto, A Parda, A Lanzada, A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea enteroleuca* Ach.), Cangas, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea enteroleuca* Ach. var. *e*. Ach.), Regueiro de Reboredo, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1986, 1987a), Quiñones de León, Monte do Castro [ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b, como *Lecidea e*. (Ach.) Ach.], Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Ferrol (GARCIA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Lecidella euphorea (Flörke) Hertel

Preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Aquela Banda (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), A Guía (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), A Fonsagrada (PÉREZ *et al.*, 1991), Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

Lecidella lacteola (Nyl.) Hertel

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Lecidella pulveracea (Schaerer) H. Sydow

Regueiro Valado (CRESPO *et al.*, 1981).

Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert

A Seca, Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea protrusa* Fr.), A Seca, A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea protrusa* Fr. var. *subviridans* A. L. Sm.?), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Lecidella stigmataea (Ach.) Hertel & Leuckert

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Lecidella viridans (Flotow) Körber

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

LECIDOMA G. Schneider & Hertel (1981)*Lecidoma demissum* (Rustr.) G. Schneider & Hertel

Parte alta de subida al Millao (GARCIA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

LEPRARIA Ach. (1803)*Lepraria incana* (L.) Ach.

Regueiro de Reboredo, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), O Couso, Gaxate-Berdudo, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Monte Pedroso

(SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), Ventín de Arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau

Peña da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a, como *L. neglecta* Vainio), Buisán (PÉREZ *et al.*, 1991, como *L. neglecta* Vainio).

LEPROCAULON Nyl. ex Lamy (1878)

Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams ex D. Hawksw.

A Guarda [NAVÁS, 1904, como *Stereocaulon nanum* (Ach.) Ach.], Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Pobra de Burón (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

LEPROLOMA Nyl. ex Crombie (1894)

Leproloma membranaceum (Dickson) Vainio

Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

LEPTOGIUM (Ach.) Gray (1821)

Leptogium brebissonii Mont.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Oitaven, Aranza (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

Leptogium burnetiae Doidge

Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

Leptogium chloromelum (Swartz ex Ach.) Nyl.

Dena, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Leptogium cochleatum (Dickson) P. Jørg. & P. James

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989, como conferible), Pico de Costoia (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körber

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927 como *L. caesium* Vainio), Ousón (BELLOT, 1952, como *L. tremelloides* Fr.), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989).

Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk

Pista de Seoane a Visuña (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Leptogium gelatinosum (With.) Laundon

Caaveiro [LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989, como *L. sinuatum* (Huds.) Massal.], Castro de Lobos (ETAYO *et al.*, 1991).

Leptogium hibernicum Mitchell ex P. M. JYrg.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), pista de Seoane a Visuña (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Castro de Lobos (ETAYO *et al.*, 1991), Moreda, Pacios (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Leptogium microphyllumoides Nyl.

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Moreda, De Folgoso a Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Leptogium palmatum (Huds.) Mont.

Vilarín de Abaixo (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Leptogium saturninum* (Dickson) Nyl.**

Ponte Carreira (BELLOT, 1952), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a, 1992a).

***Leptogium tenuissimum* (Dickson) Körber**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989).

***Leptogium teretiusculum* (Wallr.) Arnold**

A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

LEPTORHAPHIS Körber (1855)***Leptorhaphis epidermidis* (Ach.) Th. Fr.**

Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991).

***Leptorhaphis tremulae* Körber**

Ourense (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

LICHENOTHELIA D. Hawksw. (1981)***Lichenothelia scopularia* (Nyl.) D. Hawksw.**

Fornos da Cal (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

LICHINA Agardh (1817)***Lichina confinis* (C. Müller) Agardh**

Vigo (LANGE, 1860), Galicia (AMO Y MORA, 1870), Punta do Cabalo, Punta de Rande, Punta da Congorza, Punta Corveiro dos Castros (ARDRÉ, 1957), San Cibrao (ANADÓN *et al.*, 1979; POLO *et al.*, 1979), Ría de Vigo (SEOANE, 1960), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ría de Camariñas (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1963), Ría de Cedeira (PÉREZ-CIRERA, 1976), Ría de Corme e Laxe (PÉREZ-CIRERA, 1976), Costa de Camelle (PÉREZ-CIRERA & MALDONADO, 1982), Ría de Lires (PÉREZ-CIRERA & PACHECO, 1985), Boiro, Praia da Lagoa (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Lichina pygmaea* (Lightf.) Agardh**

Vigo, Pontevedra (LANGE, 1860), Pontevedra, Vigo (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889), Samil, Punta da Congorza (ARDRÉ, 1957), Ría de Vigo (SEOANE, 1960), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ría de Camariñas (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1963), Ría de Arosa (DONZE, 1968), Ría de Cedeira (PÉREZ-CIRERA, 1975), Ría de Corme e Laxe (PÉREZ-CIRERA, 1976), San Cibrao (ANADÓN *et al.*, 1979; POLO *et al.*, 1979), Costa de Camelle (PÉREZ-CIRERA & MALDONADO, 1982), Ría de Lires (PÉREZ-CIRERA & PACHECO, 1985), Aguiño, Boiro (BAHILLO *et al.*, 1987).

LITHOGRAPHA Nyl. (1857)***Lithographa tesserata* (DC.) Nyl.**

Preto de Cuntis (Leg. Seoane) (COLMEIRO, 1889).

LLIMONAEA Egea & Torrente in Torrente & Egea (1991)***Limonaea occulta* Egea & Torrente**

Illa de Ons (TORRENTE & EGEA, 1991).

LOBARIA (Schreber) Hoffm. (1796)***Lobaria amplissima* (Scop.) Forss.**

Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), río Vilaframil (PÉREZ *et al.*, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Sticta pulmonacea* Ach.), Ourense, A Coruña, Baiona (LÁZARO-IBIZA, 1898), Galicia (Leg. Sarmiento), Santiago (Leg. Colmeiro), Betanzos (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Sticta p. Ach.*), A Agüeira (BELLOT, 1952, como *Sticta pulmonacea* Ach.), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), areal de Cabanas (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.

Pico Sacro (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *Sticta s.* Ach.), Ourense (LÁZARO-IBIZA, 1898, como *Sticta s.* Ach.), Monte Galiñeiro, A Fracha, Pedra do Lagarto, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Regueiro de Reboredo, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira, Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Ourense (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Moreda, A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), de Folgoso a la Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), O Couso, Gaxate-Berdudido (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

Lobaria virens (With.) Laundon

[= *L. laetevirens* (Lightf.) Zahlbr.]

Regueiro de Reboredo (CRESPO *et al.*, 1981), Pacios (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

LOPADIUM Körber (1855)**Lopadium disciforme** (Flot.) Kullhem

A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

MACENTINA Vezda (1973)**Macentina stigonemoides** A. Orange

Montes de La Ruña (DIEDERICH, SÉRUSIAUX & BOOM, 1991).

MARONEA Massal. (1856)**Maronea constans** (Nyl.) Hepp

A Parda, Pedra do Lagarto, Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *M. constans* Zw.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Couto Chaian, Couto de

Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Gaxate-Verducido, A Laxe, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Aranza, Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

MEGALARIA Hafellner (1984)**Megalaria grossa** (Pers. ex Nyl.) Hafellner

A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

MELASPILEA Nyl. (1856)**Melaspilea ochrothalamia** Nyl.

Regueiro de Reboredo, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981).

MENEGAZZIA Massal. (1854)**Menegazzia terebrata** (Hoffm.) Massal.

San Amaro (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

MICAREA Fr. (1825)**Micarea adnata** Coppins

Eiriz (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

Micarea bauschiana (Körber) V. Wirth & Vezda

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Micarea cinerea (Schaerer) Hedl.

De Ordes a Carral, Casal, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Alto do Boi, Ponte de Folgoso a Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Micarea denigrata (Fr.) Hedl.

Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Micarea lignaria* (Ach.) Hedl.**

Grañas, Monte Carballeira, Louseiras, A Hermida, Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b).

***Micarea lutulata* (Nyl.) Coppins**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Micarea peliocarpa* (Anzi) Coppins & R. Sant.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, As Cavadas, Monte da Arca Aberta (CRESPO *et al.*, 1981), A Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Aranza (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Micarea prasina* Fr.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado (CRESPO *et al.*, 1981), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Silvoso, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), A Rogueira, ponte de Folgoso a Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a), Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

MOELLEROPSIS Gyelnik (1940)***Moelleropsis nebulosa* (Hoffm.) Gyelnik**

Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Pannaria n.* Nyl.).

NEPHROMA Ach. (1810)***Nephroma bellum* (Sprengel) Tuck.**

Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Moreda, Pacios (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

***Nephroma laevigatum* Ach.**

Monte Galiñeiro, A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *N. lusitanicum* Schaefer), Vigo (DEGELIUS, 1935, como *N. lusitanicum* Schaefer), Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978), Regueiro de Reboredo, Carballeira no Regueiro de Pereira, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), de Folgoso a la Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), San Martín de Suarna (PÉREZ *et al.*, 1991), orillas río Baldeiras (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Nephroma parile* (Ach.) Ach.**

A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Torrón (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Naraxa, Retorta (PÉREZ *et al.*, 1991), orillas río Baldeiras (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Nephroma resupinatum* (L.) Ach.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Peltigera resupinata* DC.), Galicia (Leg. Quer), Rubiás (Leg. Colmeiro), inmediaciones de Tui (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Rogueira (CARBALLAL *et al.*, 1985; ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ancares (CARBALLAL *et al.*, 1985).

***Nephroma tangeriensis* (Maheu & Guillet) Zahlbr.**

Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

NORMANDINA Nyl. (1855)***Normandina pulchella* (Borrer) Nyl.**

Vigo (DEGELIUS, 1935), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Couso, Couto de

Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Ferrol (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

OCHROLECHIA Massal. (1852)

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold

Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb.

Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Ochrolechia frigida (Swartz) Lyngé

Corga no cumio dos altos da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Ochrolechia macrospora Vers.

Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991; BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Ochrolechia pallescens (L.) Massal.

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Laxe (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Ourense [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992, como *O. parella* (L.) Massal. ssp. *pallescens* (L.) Clauz. & Roux].

Ochrolechia parella (L.) Massal.

Pontevedra, Pedra do Lagarto, A Seca (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *O. parella*

Arnold), Corrubedo, Cabo Estai, Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Ochrolechia subviridis (Høeg) Erichsen

Regueiro de Reboredo, Carballeira no Regueiro de Pereira, Castiñeira (CRESPO *et al.*, 1981), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), O Couso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Ochrolechia szatalaënsis Vers.

Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Ochrolechia tartarea (L.) Massal.

Monte Galiñeiro, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Cabo Silleiro (BAHILLO *et al.*, 1987), Monte Xesteiras, Monte Alegre, Cuntis, Pico de Costoia (CARBALLAL *et al.*, 1990,a), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

OPEGRAPHA Humb. (1793)

Opegrapha atra Pers.

Dena, Cangas, A Lanzada, Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927), A Agüeira (BELLOT, 1952), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1989), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

***Opegrapha atra* var. *cerasi* (Chevall.) Arnold**

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *O. atra* f. *parallela* Leighton).

***Opegrapha calcarea* Turner ex Sm. & Sowerby**

Portiño (TORRENTE & EGEA, 1989).

***Opegrapha conferta* Anzi**

Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *O. confluens* Stiz.), Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Corrubedo (EGEA, 1989), Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1989).

***Opegrapha confertoides* Torrente & Egea**

Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1992).

***Opegrapha herbarum* Mont.**

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Ponte Condesa, A Caeira, Santiago (CARBALLAL *et al.*, 1983). Es posible que la mayor parte de las citas bibliográficas de este taxon correspondan a *Hysterium*, un ascomicete no liquenizado.

***Opegrapha lithyrga* Ach.**

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *O. heteromorpha* Hepp.), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Opegrapha niveoatra* (Borrer) Laundon**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, Regueiro Valado, río Beduido (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Monforte de Lemos, Santiago de Compostela, Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989), de Folgoso a Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

***Opegrapha ochrocincta* Werner**

Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989).

***Opegrapha subelevata* Nyl.**

Caaveiro (TORRENTE & EGEA, 1989; LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), A Capela (ETAYO *et al.*, 1991).

***Opegrapha varia* Pers.**

Preto de Neda, Tui, Vigo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *O. varia* Pers. Fr. Nyl. var. *notha* Fr.), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, como *O. pulicaris* auct.), Vigo, Monforte de Lemos (TORRENTE & EGEA, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989, como *O. lichenoides* Pers.), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

***Opegrapha vermicellifera* (Kunze) Laundon**

Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989).

***Opegrapha vulgata* (Ach.) Ach.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), Lourizán, Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

OPHIOPARMA Norman (1853)***Ophioparma ventosum* (L.) Norman**

Monte de Cebreros (COLMEIRO, 1889, como *Lecanora ventosa* Ach.?), Pena Trevinca [CARBALLAL *et al.*, 1985, como *Haematomma v.* (L.) Massal.].

PACHYPHIALE Lönnr. (1858)***Pachyphiale carneola*** (Ach.) Arnold

Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Seoane [ALVAREZ & CARBALLAL, 1990, como *P. cornea* (With.) Poetsch].

PANNARIA Delise (1828)***Pannaria conoplea*** (Ach.) Bory

Dena, Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. rubiginosa* Del. var. *conoplea* Körber), Chapela [DEGELIUS, 1935, como *P. pityrea* (DC.) Degel.], Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Retorta, Naraxa (PÉREZ *et al.*, 1991).

Pannaria leucophaea (Vahl) P. M. Jørg.

Preto de Vigo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. microphylla* ?Massal.?).

Pannaria mediterranea Tavares

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Monte Lobeira (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), de Folgoso a la Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), O Couso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

Pannaria pezizoides (Weber) Trevisan

Ponte de Froxán a Castro Portela (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Pannaria praetermissa Nyl.

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory

Preto de Ferrol, Vigo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. rubiginosa* Delise), Vigo (DEGELIUS, 1935), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), río Vilaframil (PÉREZ *et al.*, 1991), orillas río Baldeiras (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Pannaria sampaiana Tavares

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Pannaria tavaresii P. JYrg.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989).

PARMELIA Ach. (1803)***Parmelia arnoldii*** Du Rietz

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral [CRESPO *et al.*, 1981, como *Parmotrema a.* (Du Rietz) Hale], Campelo, Ventín-Broullosa [BAHILLO & CARBALLAL, 1991, como *Parmotrema a.* (Du Rietz) Hale], Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Louseiras, Pedreiras, Curro de Caudaoso (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

Parmelia austrosinensis Zahlbr.

[= *P. meridionalis* Tavares]

Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ombre, Porto da Gañidoira, Parga (CARBALLAL *et al.*, 1991b).

Parmelia borreri (Sm.) Turner

A Guarda (NAVÁS, 1901), de Ordes a Carral, As Cavadas, Casas de Borducedo Grande, Cañas,

Aquela Banda, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Parmelia caperata* (L.) Ach.**

Galicia (Leg. Lange), Caldas de Reis (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Guarda (LÁZARO IBIZA, 1898), A Guarda (NAVÁS, 1901), Pedra do Lagarto, A Parda, Pontevedra, Salcedo, Redondela, Catoira, Monte Galíñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), río Deo (DALDA, 1972, como *P. caperata* DC.), Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Casal (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian, Couto de Couso [CRESPO *et al.*, 1983, como *Pseudoparmelia* c. (L.) Hale], Santiago de Compostela [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985, como *P. caperata* (L.) Hale], Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Cuntis, areal de Cabanas, Monte Xesteiras, San Gregorio (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Anceu, Aranza, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso, Freaza, San Amaro, Sotomayor, Ventín-Broullosa (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo, O Couso, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Cambre, Queixas (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Parmelia conspersa* (Ehrh. ex Ach.) Ach.**

Inmediaciones de Tui (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), A Caeira, Monte de Castro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. conspersa* Ach. r. *lusitana* Samp.?), Carteire (SEIJAS, 1952), Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Parmelia conspersa* var. *subconspersa* (Nyl.) Gyelnik**

A Guarda (NAVÁS, 1901).

***Parmelia crinita* Ach.**

A Guarda (NAVÁS, 1901, como *P. pilosella* Hue), Monte Galíñeiro, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. pilosella* Hue), Regueiro Reboredo, Regueiro Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas [CRESPO *et al.*, 1981, como *Parmotrema crinitum* (Ach.) Hale], Couto de Chaian [CRESPO *et al.*, 1983, como *Parmotrema crinitum* (Ach.) Hale], Cuntis (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

***Parmelia endochlora* Leighton**

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985).

***Parmelia exasperata* de Not.**

Redondela, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), O Rocín (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Campelo, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Fornelos do Monte (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Parmelia exasperatula* Nyl.**

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983; CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985).

***Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.**

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. fuliginosa* Nyl. var. *laetevirens* Nyl.), Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978, como *P. laetevirens*), Couto de Couso (CRESPO et al., 1983), Monte do Porte (ETAYO et al., 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pedreira [PÉREZ et al., 1991, como *P. laetevirens* (Flotow ex Körber) Rosend.], Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1992; BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Parmelia glabratula* ssp. *fuliginosa* (Fr. ex Duby) Laundon**

A Caeira, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. fuliginosa* Nyl.), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Buisán (PÉREZ et al., 1991), Ribeira Pequena [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991, como *P. fuliginosa* (Fr. ex Duby) Nyl.].

***Parmelia horrescens* Taylor**

Pedra do Lagarto, Armementeira, Salcedo (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. dissecta* Nyl.), Regueiro de Reboredo, As Cavadas, Monte da Ara Aberta, Cañas, río Beduido [CRESPO et al., 1981, como *Parmelina dissecta* (Nyl.) Hale], Couto de Couso [CRESPO et al., 1983, como *Parmelina h.* (Taylor) Hale], Lourizán, Marín (CARBALLAL et al., 1983), Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Parmelia laevigata* (Sm.) Ach.**

Monte Galiñeiro, Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO et al., 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monte da Fracha (CARBALLAL et al., 1991a), Monte do Porte (ETAYO et al., 1991).

***Parmelia loxodes* Nyl.**

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. isidiolyta* Nyl.), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Cuntis (CARBALLAL et al., 1991a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), A Pobra de Burón (VALCÁRCEL et al., 1992).

***Parmelia mougeotii* Schaerer ex D. Dietr.**

Monte do Marmoiral (VALCÁRCEL et al., 1992).

***Parmelia omphalodes* (L.) Ach.**

Preto de Lugo (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *P. saxatilis* Ach. var. *omphalodes* Fr.), A Guarda (NAVÁS, 1901), Monte Galiñeiro, A Fracha, A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Fisterra (BAHILLO et al., 1987), Cuntis, Pico da Edreida, Montes de Carrio, Castro Sebil (CARBALLAL et al., 1991a), Penada Moura (ETAYO et al., 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

***Parmelia pastillifera* (Harm.) R. Schubert & Klem.**

A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Campelo, ALaxe (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Parmelia perforata* (Jacq.) Ach.**

A Guarda (NAVÁS, 1901).

***Parmelia perlata* (Huds.) Ach.**

[= *Parmotrema chinense* (Osbeck) Hale & Ahti]

Galicia (Leg. Lange), inmediaciones Lugo, Ourense (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Coruña (LÁZARO-IBIZA, 1898), A Guarda, Mondariz (NAVÁS, 1901, como *P. perlata* L. y *P. trichotera* Hue), Redondela, Salcedo, Monte Galiñeiro, Dena, Catoira, Pontevedra, A Parda, A Seca, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. trichotera* Hue), Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil,

Carballeira no Regueiro de Pereira, De Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Aquela Banda [CRESPO *et al.*, 1981, como *Parmotrema perlatum* (Ach.) Hale], Couto de Chaian, Couto de Couso [CRESPO *et al.*, 1983, como *Parmotrema perlatum* (Ach.) Hale], Santiago de Compostela [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985, como *Parmotrema perlatum* (Ach.) Hale], Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Ferrol, Cabalo Branco (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991, como *P. chinense* Osbeck), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Anceu, Aranza, Campelo, O Couso, A Laxe, Sotomayor, Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992, como *P. chinense* Osbeck), Aranza, Campelo, Pazos de Borbén, Ventín de Arriba (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993, como *P. chinense* Osbeck), Cambre, Queixas (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Parmelia pulla Ach.

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. prolixa* Carroll), río Deo (DALDA, 1972, como *P. prolixa* Ach.), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), A Pobra de Burón (PÉREZ *et al.*, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Parmelia quercina (Willd.) Vainio

Redondela, A Fracha, Pedra do Lagarto, A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. carporrhizans* Taylor), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991).

Parmelia reticulata Taylor

[= *Parmotrema reticulatum* (Taylor) M. Choisy]

Pedra do Lagarto, Redondela, Cangas, A Lanzada, Salcedo, Catoira (SAMPAIO & CRESPI,

1927, como *P. cetrata* ?Ach.?), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian, Couto de Couso [CRESPO *et al.*, 1983, como *Parmotrema reticulatum* (Taylor) M. Choisy y como *P. pseudoreticulatum* (Tavares) Hale], Ponte Condesa, Lourizán, Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983, como *P. pseudoreticulata* Tavares), Santiago de Compostela [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985, como *Parmotrema pseudoreticulatum* (Tavares) Hale], Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Cabo Silleiro, Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Cospeito (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

Parmelia revoluta Flörke

A Guarda, Mondariz (NAVÁS, 1901), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian [CRESPO *et al.*, 1983, como *Hypotrachyna r.* (Flörke) Hale], Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Aranza, Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén, Pazos de Borbén-Moscoso, Freaza, Xesta (BAHILLO &

CARBALLAL, 1992), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Parmelia robusta Degel.

Lourizán, Portocelo, Marín (CARBALLAL *et al.*, 1983), A Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro, A Coruña (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Pico Sacro (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Louseiras (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Aranza, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

A Coruña (LÁZARO-IBIZA, 1898), Galicia (Leg. Quer), preto de Santiago de Compostela (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Coruña (NAVÁS, 1901), Salcedo, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981), Illas Sisargas (BAHILLO *et al.*, 1987), Cuntis (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Porto da Gañidoira, Lanzós, Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, Pazos de Borbén-Moscoso, Ventín-Broullosa, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Parmelia sinuosa (Sm.) Ach.

Preto de A Coruña (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. sinuosa* Ach.), A Coruña (LÁZARO-IBIZA, 1898, como *P. sinuosa* E. Fr.), A Coruña (NAVÁS, 1901), río Deo (DALDA, 1972, como *P. laevigata* Ach. var. s. Fr.), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

Parmelia soreadians Nyl.

Pontevedra, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

Parmelia sorediosa Almb.

Parte alta de subida al Millao, bajada al arroyo de Xiestas [GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993, como *Melanelia sorediata* (Ach.) Goward & Ahti].

Parmelia stuppea Taylor

Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Illas Sisargas (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Parmelia subaurifera Nyl.

Redondela, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Castiñeira (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Aranza, Campelo, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Parmelia subrudecta Nyl.

Pedra do Lagarto, A Parda, Pontevedra, A Seca, Salcedo, Vigo, A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. dubia* Schaefer), Regueiro de Reboredo, Carballeira de Antemil, de Ordes a Carral, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian, Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Santiago de Compostela (CA-

SARES, 1986), Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

***Parmelia sulcata* Taylor**

Redondela, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian, Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Vilanova de Arousa (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Aranza, Campelo, O Couso, A Laxe, Pazos de Borbén-Moscoso, Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo, O Couso (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Parmelia taractica* Krempelh.**

A Guarda (NAVÁS, 1901, como *P. conspersa* var. *stenophylla* Ach.).

***Parmelia taylorensis* M. Mitchell**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Quiñones de León, Monte do Castro (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989).

***Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.**

Preto de Lugo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), A Guarda (NAVÁS, 1901, como *P. tiliacea* f. *munda* Schaeer), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL &

GARCÍA-MOLARES, 1988), Ombre (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Parmelia tinctina* Maheu & A. Gillet**

Fisterra, Cee, Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

***Parmelia verruculifera* Nyl.**

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985).

***PARMELIELLA* Müll. Arg. (1862)**

***Parmeliella jamesii* S. Ahlner & P. M. Jørg.**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), O Couso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Parmeliella testacea* P. M. JYrg.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Aranza, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993), río Vilaframil (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Parmeliella triptophylla* (Ach.) Müll. Arg.**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

***PARMELIOPSIS* (Nyl.) Nyl. (1866)**

***Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.**

De Folgoso a Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

***Parmeliopsis hyperopta* (Ach.) Arnold**

Pedra do Lagarto, Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

PELTIGERA Willd. (1787)**Peltigera aphthosa** (L.) Willd.

Inmediaciones de Vigo, Tui, Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Parmelia a. Hoffm.*).

Peltigera canina (L.) Willd.

Galicia (COLMEIRO, 1851), Galicia (Leg. Quer, Colmeiro) (COLMEIRO, 1889), Baiona (LÁZARO-IBIZA, 1898), Armenteira, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Cacheiras (BELLOT, 1952), Carteire (SEIJAS, 1952), Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), río Deo (DALDA, 1972), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

Peltigera collina (Ach.) Schrader

Preto de Vigo, Tui (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. polydactyla* Hoffm. var. *scutata* Fr.), Pedra do Lagarto, San Ciprián (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. scutata* Sm.?), Regueiro de Reboredo, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Naraxa (PÉREZ *et al.*, 1991).

Peltigera dегenii Gyelnik

A Fonsagrada (VALCÁCEL *et al.*, 1993).

Peltigera didactyla (With.) Laundon

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. spuria* DC.).

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Ourense (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Fornos da Cal (PÉREZ *et al.*, 1991).

Peltigera lactucifolia (With.) Laundon

Fentosa (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993, como conferible).

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyelnik

Taboada, Torrón (CARBALLAL *et al.*, 1991a), orillas río Baldeiras (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Peltigera malacea (Ach.) Funck

Moneixas (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.

A Capela (ETAYO *et al.*, 1991), A Pobra de Burón (VALCÁCEL *et al.*, 1993).

Peltigera polydactyla (Necker) Hoffm.

Preto de Caaveiro (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Taboada (CARBALLAL *et al.*, 1990,a), Vilarín de Abaixo (PÉREZ *et al.*, 1991).

Peltigera ponogensis Gyelnik

Pedreira (VALCÁCEL *et al.*, 1993).

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf

Marín (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. canina* Willd. r. p. G. Samp.), Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), Vilarín de Abaixo (PÉREZ *et al.*, 1991), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

Peltigera rufescens (Weis) Humb.

Lugo (Leg. Lange), preto de Padrón, Cuntis, Ponte San Paio (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. rufescens* Hoffm.).

Peltigera venosa (L.) Hoffm.

Areal de Cabanas (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

PERTUSARIA DC. (1805)**Pertusaria albescens** (Huds.) M. Choisy & Werner

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-

MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Pertusaria albescens var. *corallina* (Zahlbr.) Laundon

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Pertusaria albescens var. *globulifera* (Turner) Poelt

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. globulifera* ?Nyl.?), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

Pertusaria alpina Hepp ex Ahles

Redondela (HANKO, 1983), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989; LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Pertusaria amara (Ach.) Nyl.

Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. faginea* Leighton), Lestedo (BELLOT, 1952), Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978), Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas, Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Cuntis (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-

MOLARES, 1991), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Anceu, Aranza, Pazos de Borbén-Moscoso, Ventín-Broullosa, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993), Queixas (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Pertusaria carneopallida (Nyl.) Anzi ex Nyl.

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983).

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.

Armenteira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboreda, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Cospeito, Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), Queixas, Belesar (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), Mangüéiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Pertusaria corallina (L.) Arnold

Vilalba (HANKO, 1983), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Pertusaria dispar Steiner

Lourizán (CARBALLAL *et al.*, 1983).

Pertusaria exalbescens Nyl.

Redondela, Pedra do Lagarto, A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

Pertusaria excludens Nyl.

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. ceuthocarpa* Turn. ?var. *variolosa* Mudd. Man.?), Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Vilarín de Arriba (PÉREZ *et al.*, 1991).

Pertusaria flava (DC.) Laundon

Montes de Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977, como *P. lutescens*), Santiago de Compostela, Ponte Condesa (CARBALLAL *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985, CASARES, 1986), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), de Folgoso a la Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992), orillas río Baldeiras [GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993, como *P. lutescens* (Hoffm.) Lamy].

Pertusaria glomerata (Ach.) Schaeer

Preto de Lugo (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889).

Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen

Entre Xermiñas e Agromaior, de Ordes a Carral (CRESPO *et al.*, 1981), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Godóns (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Pertusaria heterochroa (Müll. Arg.) Erichsen

Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Pertusaria hymenea (Ach.) Schaeer

Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. wulfenii* DC.), Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, Carballera de Antemil,

de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Pertusaria lactea (L.) Arnold

Barbeitos (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

Pertusaria lecanoroides Erichsen

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a).

Pertusaria leioplaca DC.

Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballera no Regueiro Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado (CRESPO *et al.*, 1981), preto a Central de Meirama, de Ordes a Carral, Monte do Dono [CRESPO *et al.*, 1981, como *P. leucostoma* (Bernh.) Massal.], Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Amoedo [BAHILLO & CARBALLAL, 1991, como *P. leucostoma* (Bernh.) Massal.], Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991), Ourense [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992, como *P. leucostoma* (Bernh.) Massal.], Campelo, Aranza (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Pertusaria melanochlora (DC.) Nyl.

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), A Guarda, Malpica (HANKO, 1983).

Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl.

(= *P. leptospora* Nitschke ex Lahm)

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Rieiro (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Pertusaria pertusa* (Weigel) Tuck.**

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. communis* DC.), Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. communis* DC. var. *rupestris* DC.), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Vilalba, A Guarda (HANKO, 1983), Cabo Silleiro, Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Ferrol (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Corga do Aguacenza (CARBALLAL & LOPEZ DE SILANES, 1991), Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

***Pertusaria pseudocorallina* (Liljeblad) Arnold**

Redondela, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. pseudocorallina* Samp.), A Caeira (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. pseudocorallina* Samp. var. *concreta* G. Samp.), Corrubedo, Illas Sisargas, Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Monte Pedroso (SANCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

***Pertusaria pulvereosulphurata* Harm.**

Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991).

***Pertusaria pustulata* (Ach.) Duby**

Redondela, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. pustulata* Nyl.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Vigo (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1987a), Caaveiro (LOPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), Queixas, Xanceda, Pontevedra (GARCIA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Pertusaria trachythallina* Erichsen**

Regueiro de Reboredo [CRESPO *et al.*, 1981, como *P. laevigata* (Nyl.) Arnold], Monforte de Lemos [ALVAREZ & CARBALLAL, 1988, como *P. laevigata* (Nyl.) Arnold], Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Aranza, A Laxe (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Aranza, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borben-Moscoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Campelo, Pazos de Borbén-Moscoso (BAHILLO & LOPEZ DE SILANES, 1993).

***Pertusaria tumidula* Erichsen**

Peña Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985).

PHAEOGRAPHIS Müll. Arg. (1882)***Phaeographis dendritica* (Ach.) Müll. Arg.**

Catoira, Dena, Cangas, Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Graphis d.* Ach.), Lestedo (BELLOT, 1952, como *Graphis d.* Ach.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Vigo (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1987a), Caaveiro (LOPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), Queixas, Xanceda, Pontevedra (GARCIA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Phaeographis inusta* (Ach.) Müll. Arg.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LOPEZ DE SILANES, 1985), Caaveiro (LOPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987, 1991b), Aranza (BAHILLO & CARBALLAL, 1991, 1992), Escourido (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Phaeographis lyellii* (Sm.) Zahlbr.**

Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Graphis l.* Ach.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Cañas (CRESPO et al., 1981), Couto de Chaian (CRESPO et al., 1983), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987).

***Phaeographis smithii* (Leighton) B. de Lesd.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO et al., 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Pambre (ETAYO et al., 1991).

PHAEOPHYSCIA Moberg (1977)***Phaeophyscia chloantha* (Ach.) Moberg**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, como *Physcia luganensis* Mereschk.), A Coruña (CARBALLAL et al., 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993, como *Physcia luganensis* Mereschk.).

***Phaeophyscia ciliata* (Hoffm.) Moberg**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Parmelia cycloselis* Ach.).

***Phaeophyscia endophoenicea* (Harm.) Moberg**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Phaeophyscia hirsuta* (Mereschk.) Moberg
(= *Physcia h.* Mereschk.)**

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Phaeophyscia nigricans* (Flörke) Moberg**

A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Physcia sciastrella* Harm.), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Phaeophyscia orbicularis* (Necker) Moberg**

Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Physcia o. ¿Dalla Torre & Sarnth?*), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL et al., 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

PHLYCTIS Wallr. (1825)***Phlyctis agelaea* (Ach.) Flotow**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Casas de Borducedo Grande (CRESPO et al., 1981), Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b).

***Phlyctis argena* (Sprengel) Flotow**

Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Casal (CRESPO et al., 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

PHYLLISCUM Nyl. (1855)

Phylliscum demangeonii (Moug. & Mont. in Mont.) Nyl.

San Ciprián (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

PHYSCIA (Schreber) Michaux (1803)

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

Preto a Central de Meirama, Regueiro Valado, Cañas, Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Ferrol (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.

Pedra do Lagarto, A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. aipolia* Nyl.), preto a Central de Meirama, Regueiro Valado, Cañas, Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ourense (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Physcia aipolia var. *caesiopruinosa* (Arnold) Santha

A Fonsagrada (PÉREZ *et al.*, 1991).

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. caesia* Nyl.), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987), Pontevedra

(CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol (CARBALLAL *et al.*, 1991a; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Pobra de Burón (PÉREZ *et al.*, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Ferrol (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Physcia clementei (Sm.) Maas Geest.

Pedra do Lagarto, Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. astroidea* Nyl.), Cañas, Aquela Banda (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a).

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau

Santiago de Compostela (CARBALLAL *et al.*, 1983), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

Physcia semipinnata (Gmelin) Moberg

Regueiro Valado, Cañas, Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Fornelos de Montes (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

Physcia stellaris (L.) Nyl.

Pedra do Lagarto, Redondela, A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Lestedo (BELLOT, 1952), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Alto do Boi, Moreda (ALVAREZ

& CARBALLAL, 1992a), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Physcia tenella* (Scop.) DC.**

Dena, Pedra do Lagarto, Redondela, A Lanzada, A Seca, A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. hispida* Tuck.), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *P. hispida* Tuck. r. *leptalea* G. Samp.), Regueiro Valado (CRESPO et al., 1981), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña (CARBALLAL et al., 1991a, 1990b), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991) Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Ferrol (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

***Physcia tenella* var. *marina* (A. E. Nyl.) Lyngé**

Corrubedo [BAHILLO et al., 1987, como *P. tenella* ssp. *marina* (Nyl.) D. Hawksw.].

***Physcia tribacia* (Ach.) Nyl.**

A Lanzada, Dena, A Seca, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985; Casares, 1986), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Physcia tribacoides* Nyl.**

A Parda, Redondela, A Caeira, Pontevedra, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Cañás (CRESPO et al., 1981), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), A Coruña (CARBALLAL et al., 1990).

PHYSCONIA Poelt (1965)

***Physconia distorta* (With.) Laundon**

Neda, preto de Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *P. pulverulenta* Nyl.), preto de Pontevedra (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia pulverulenta* Nyl. var. *venusta* Schae.), Redondela (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Physcia pulverulenta* Nyl. var.

venusta Oliver.), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988, como *P. pulverulacea* Moberg), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a, como *P. pulverulacea* Moberg), Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991, como *P. pulverulacea* Moberg).

***Physconia enteroxantha* (Nyl.) Poelt**

Santiago de Compostela (CARBALLAL et al., 1983), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Physconia grisea* (Lam.) Poelt**

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Physcia* g. *Zahlbr.*), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Ferrol [CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991, como *Physcia* g. (Lam.) *Zahlbr.*], Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992).

***Physconia muscigena* (Ach.) Poelt**

Preto de Ferrol, Pontedeume (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia m.* Nyl.).

***Physconia perisidiosa* (Erichsen) Moberg**

Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira [CRESPO et al., 1981, como *P. farrea* (Ach.) Poelt], Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

PLACYNTHIELLA Elenkin (1909)

***Placynthiella icmalea* (Ach.) Coppins & P. James [= *Saccomorpha i.* (Ach.) Clauz. & Roux]**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Aranza, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Placynthiella uliginosa* (Schradler) Coppins & P. James**

A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

PLACYNTHIUM (Ach.) Gray (1821)

Placynthium nigrum (Huds.) Gray

Mollabao, Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ de Silanes, 1992), Vilarín de Abaixo (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

PLATISMATIA Culb. & C. Culb. (1968)

Platismatia glauca (L.) Culb. & C. Culb.

Monte Galiñeiro, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Platysma glaucum* Nyl.), entre A Fonsagrada e Castroverde (ABBAYES, 1945, como *Cetraria g.* Ach.), Monte Alegre, Anllo (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Campelo, Amoedo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Corga do Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Louseiras, Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b).

POLYBLASTIA Massal. (1852)

Polyblastia sepulta Massal.

Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

POLYCHIDIUM (Ach.) Gray (1821)

Polychidium dendriscum (Nyl.) Henssen

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989).

Polychidium muscicola (Swartz) Gray

Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989).

POLYSPORINA Vezda (1978)

Polysporina simplex (Davies) Vezda

Dena, A Fracha, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Biatorella s.* Br. & Rostr.).

Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), A Pobra de Burón (VALCÁRCEL *et al.*, 1992), Godons (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

PORINA Müll. Arg. (1883)

Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.

Regueiro de Reboreda, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Porina borreri (Trevisan) D. Hawksw. & P. James

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987).

Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Porina lectissima (Fr.) Zahlbr.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Porina leptalea (Durieu & Mont.) A. L. Sm.

Quiñones de León, Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987).

POROCYPHUS Körber (1855)

Porocyphus rehmicus (Massal.) Zahlbr.

Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *?Psorotrichia rehmii* Körber?).

PORPIDIA Körber (1855)

Porpidia albocaerulescens (Wulff) Hertel & Knoph

A Fracha, Cangas, Mogor (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea a.* Ach.).

Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph

Acevo (PÉREZ et al., 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992), parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph

Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea c.* Körber), Fornos da Cal (PÉREZ et al., 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

Porpidia hydrophila (Fr.) Hertel & Schwab.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & Schwab

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea m.* DC.), Pambre [ETAYO et al., 1991, como *P. nigrocruenta* (Anzi) Hertel], Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992), Silvela (VALCÁRCEL et al., 1992), subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Porpidia platycarpoides (Bagl.) Hertel

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea p.* Bagl.), Caaveiro [LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a, como *P. cinereoatra* (Ach.) Hertel & Knoph var. *platycarpoides* (Bagl.) BOISSIERE & ROUX].

Porpidia soredizodes (Lamy ex Nyl.) Laundon

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

PROTOBLASTENIA (Zahlbr.) Steiner (1911)

Protoblastenia rupestris (Scop.) Steiner

Fornos da Cal (VALCÁRCEL et al., 1992).

PROTOPARMELIA M. Choisy (1929)

Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner var. *ciniereobadia* Harm.

Pena da Moura (ETAYO et al., 1991), Montouto (VALCÁRCEL et al., 1992).

Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis

Silvela (VALCÁRCEL et al., 1992, como *Lecanora psarophana* Nyl.).

Protoparmelia picea (Dickson) Hafellner

Acevo (VALCÁRCEL et al., 1992).

PSEUDEVERNIA Zopf (1903)

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Preto de Santiago de Compostela (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Evernia f.* Mann.), Montes do Invernadeiro [CASTROVIEJO, 1977, como *Parmelia f.* (L.) Ach.], entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, As Cavadas (CRESPO et al., 1981), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Xesta, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Alto da Gañidoria, Curro de Caudoso, Cospeito (CARBALLAL et al., 1991b), Castro de Lobos, Pena da Moura (ETAYO et al., 1991), Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

PSEUDOCYPHELLARIA Vainio (1890)

Pseudocypsellaria aurata (Ach.) Vainio

Caaveiro (CARBALLAL et al., 1985).

PSILOLECHIA Massal. (1860)

Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Vilarín de Abaixo (VALCÁRCEL et al., 1992).

PSOROMA (Ach.) Michaux (1803)

Psoroma hypnorum (Vahl) Gray

Peña Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985),
Ponte de Boadil (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

PYCNOTHELIA Dufour (1821)

Pycnothelia papillaria Dufour

Negueira de Muñiz (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

PYRENOCOLLEMA Reinke (1885)

Pyrenocollema halodytes (Nyl.) R. C. Harris

Vigo, Cangas, preto de A Coruña [SANTESSON, 1939, como *Arthopyrenia sublitoralis* (Leight.) Arn.], Fisterra [BAHILLO *et al.*, 1987, como *Arthopyrenia h.* (Huds.) Vainio].

PYRENULA Massal. (1852)

Pyrenula chlorospila Arnold

A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990,b).

Pyrenula macrospora (Degel.) Coppins & P. James

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991).

Pyrenula nitida (Weigel) Ach.

Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Carballeira Antemil, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Monte do Dono (CRESPO *et al.*, 1981).

Pyrenula nitidella (Flörke ex Schaeerer) Müll. Arg.

Cangas, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

PYRRHOSPORA Körber (1885)

Pyrrhospora lusitanica Hafellner
(= *Protoblastenia l.* Räsänen)

Ribeira Pequena (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991; HAFELLNER, 1993), Alto do Boi (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Pyrrhospora quernea (Dickson) Körber

Entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Casas de Borducedo Grande, Cañas (CRESPO *et al.*, 1981), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

Pyrrhospora russula (Ach.) Hafellner
[= *Protoblastenia r.* (Ach.) Räsänen]

Porto do Canizo (BARRENO & VAZQUEZ, 1981). Según HAFELLNER (1993), esta especie es extraeuropea, la cita podría corresponder a *P. lusitanica*.

RAMALINA Ach. (1810)

Ramalina calicaris (L.) Fr.

Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889, como *R. calicaris* Fr. var. *canaliculata* Fr.), Dena, Piedra de Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Cuntis (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

Ramalina cuspidata (Ach.) Nyl.

A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *R. cuspidata* Nyl. f. *gracilis* H. Olivier?), Sanxenxo (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Ribadeo (ABBAYES, 1945, como *R. curnowii* Cromb.), Estaca de Bares (FOLLMANN, 1973, como *R. armorica* Nyl. y como *R. curnowii* Crombie s. str.), Illas Cies (FOLLMANN, 1973, como *R. cuspidata* Culb.), Corrubedo (BAHILLO *et al.*,

1987, como *R. atlantica* W. Culb.), Corrubedo, Ribeira (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Ramalina farinacea* (L.) Ach.**

Dena, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Lestedo (BELLOT, 1952, como *R. calicaris* var. *farinacea* L.), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande, Cañás, Aquela Banda (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pena (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Rogueira, Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Fene (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1991), Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Campelo, Gaxate-Verducido, A Laxe, Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Corgo do Cernadiño (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992), Ourense (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1992).

***Ramalina farinacea* var. *hypoprotocetrarica* (L. Culb.) Clauz. & Roux**

San Cristobo (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Ramalina farinacea* var. *reagens* B. de Lesd.**

Pedreira (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Ramalina fastigiata* (Pers.) Ach.**

Comarca Compostelana (TEXIDOR, 1869, como *R. fastigiata* Ach.), preto de Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889, como *R. calicaris* Fr. var. *f.* Fr.), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *R. populina* Vainio), Vigo (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1987a), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCIA-MOLARES, 1988), O Courel (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b).

***Ramalina fraxinea* (L.) Ach.**

Na ponte de Cruzul (BELLOT, 1952, como *R. calicaris* Fr var. *f.* L.), Carballeira no Regueiro de Pereira [CRESPO *et al.*, 1981, como *R. fraxinea* subsp. *calicariformis* (Nyl.) B. de Lesd.], Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pena (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991).

***Ramalina panizzei* de Not.**

Naraxa (VALCÁRCEL *et al.*, 1993).

***Ramalina pollinaria* (Westr.) Ach.**

Guntemil (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1993), parte alta de subida al Millao (GARCIA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Ramalina polymorpha* (Liljeblad) Ach. var. *capitata* (Ach.) Ach.**

Morgade (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

***Ramalina siliquosa* (Hudson) A. L. Sm.**

A Coruña [LANGE, 1860, como *R. scopulorum* (Retz.) Ach., A Coruña (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889), Cabo Vilan [FOLLMANN, 1973, como *R. crassa* (Delise ex Nyl.) Mot.], Illas Cies (FOLLMANN, 1973, como *R. druidarum* Culb.), Fisterra (FOLLMANN, 1973, como *R. siliquosa* s. str.), Ría de Corme y Laxe (PÉREZ-CIRERA, 1976, como *R. cantabrica*), Costa de Camelle (PÉREZ-CIRERA & MALDONADO, 1982), Ría de Lires (PÉREZ-CIRERA & PACHECO, 1985), Fisterra, Aguiño (BAHILLO *et al.*, 1987), Santa Cruz do Salto, Punta Agueiras (CARBALLAL *et al.* (1990 a), Corrubedo [EGEA, 1989, como *R. siliquosa* var. *crassa* (Delise ex Nyl.) Mot.].

***Ramalina subfarinacea* (Nyl. ex Crombie) Nyl.**

A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

RAMONIA Stizenb. (1862)

Ramonia chrysophaea (Pers.) Vezda

Entre Xermiñas e Agromaior (CRESPO *et al.*, 1981).

RHIZOCARPON Lam. ex DC. (1805)

Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Sprengel) Th. Fr.

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992), entre Caseiro y Belecón (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Rhizocarpon disporum (Naegeli ex Hepp) Müll. Arg.

Rodeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

Galicia (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *Lecidea geographica* Schaeerer), Monte Galiñeiro, A Fracha, Monte Castro, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Serra de Ancares (CRESPI, 1930), Serra del Muradal (PÉREZ *et al.*, 1991), Monte Pedroso [Sánchez-Biezma & al., 1992, como *R. riparium* Räsänen ssp *riparium* y como *R. riparium* Räsänen subsp. *lyndsayanum* (Räsänen) Thomson], San Martín de Suarna (VALCÁRCEL *et al.*, 1992, como *R. riparium* Räsänen), parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

Rhizocarpon lecanorinum Anders

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Rhizocarpon obscuratum (Ach.) Massal.

Mogor, Monte de Castro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Mogor, Monte de Castro (Leg. Sampaio, Crespí) (CRESPI, 1930), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Vilarín de Abaixo (PÉREZ *et al.*, 1991), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Rhizocarpon plicatile (Leighton) A. L. Sm.

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Rhizocarpon polycarpon (Hepp) Th. Fr.

Monte de Castro (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Rhizocarpon ricardii (Nyl.) Zahlbr.

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987, como *R. constrictum* Malme), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992, como *R. constrictum* Malme).

Rhizocarpon sphaerosporum Räsänen

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992; SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Rhizocarpon subposticum (Nyl.) Arnold

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körber

Monte Galiñeiro, Monte de A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927). Esta cita ha sido anulada posteriormente por CRESPI (1930).

RHIZOPLACA Zopf (1905)

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf

Monte Cebrero (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Squamaria c.* Nyl.?), A Caeira, Mollabao (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Psoroma chrysoleucum* Ach.).

Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert & Poelt

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985), Monte do Piñor (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

RIMULARIA Nyl. (1868)

Rimularia insularis (Nyl.) Rambold & Hertel

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Rimularia limborina Nyl.

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

RINODINA (Ach.) Gray (1821)

Rinodina alba Metzler ex Arnold

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

Rinodina atrocinerea (Dickson) Körber

A Caeira, Monte de A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *R. plumbella* H. Olivier).

Rinodina beccariana Bagl. var. *beccariana*
[= *R. subglaucescens* (Nyl.) Sheard]

Boiro (BAHILLO *et al.*, 1987), Corrubedo (EGEA, 1989).

Rinodina confinis G. Samp.

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Rinodina confragosa (Ach.) Körber

Fisterra, Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991).

Rinodina efflorescens Malme

Mercurín, pista de Seoane a Visuña, ponte de Folgoso a Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b).

Rinodina exigua (Ach.) Gray

Mollabao (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

Rinodina gennarii Bagl.

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991,a)

Rinodina luridescens (Anzi) Arnold

Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

Rinodina oxydata (Massal.) Massal.

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *R. discolor* Arnold), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Rinodina polyspora Th. Fr.

Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

Rinodina roboris (Dufour ex Nyl.) Arnold

Redondela, Cangas, Dena, Armenteira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Santiago de Compostela (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988; GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

Rinodina santorinensis J. Steiner var. *olivieri*
(G. Samp.) Mayrh. & Sattler

Cedeira, Fisterra (MAYRHOFER *et al.*, 1993)

Rinodina sophodes (Ach.) Massal.

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *L. sophodes* Ach.), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), San Amaro, Fornelos de Montes (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), O Rocín (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Fornelos de Montes (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

ROCCELLA DC. (1805)

Roccella fuciformis (L.) DC.

A Coruña (LANGE, 1860), A Coruña (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889), Fisterra, Illas Sisargas (BAHILLO *et al.*, 1987), Punta Águeiras (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

Roccella phycopsis (Ach.) Ach.

A Coruña (LANGE, 1860), A Coruña (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889), Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *R. fucooides* Vainio), Fisterra,

Illas Sisargas, Corrubedo, Castro Baroña (BAHILLO *et al.*, 1987), Corrubedo (EGEA, 1989), Punta Agueiras (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

Roccella tinctoria DC.

Galicia (Leg. Sarmiento) (COLMEIRO, 1889). Probablemente una cita errónea, dada la distribución de la especie.

Roccella tuberculata Vainio

Aguiño, Fisterra, Illas Sisargas, Ribeira (CARBALLAL *et al.*, 1985), Illas Sisargas, Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987).

Roccella vicentina (Vainio) Vainio

Fisterra, Illas Sisargas (CARBALLAL *et al.*, 1985), Fisterra, Corrubedo, O Grove, Illas Sisargas (BAHILLO *et al.*, 1987), Corrubedo, Costas de Galicia (EGEA, 1989).

SARCOGYNE Flotow (1851)

Sarcogyne clavus (DC.) Krempelh.

Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Biatorella c. Fr.*).

Sarcogyne privigna (Ach.) Massal.

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA *et al.*, 1992).

Sarcogyne regularis Körber

A Fracha, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Biatorella pruinosa* Mudd).

SCHAERERIA Th. Fr. (1855)

Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauz. & Roux

A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea f. Nyl.*), Serra do Muradal [VALCÁRCEL *et al.*, 1992, como *S. tenebrosa* (Flotow) Hertel & Poelt], parte alta de subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

SCHISMATOMMA Flotow & Körber ex Massal. (1852)

Schismatomma decolorans (Turner & Borrer ex Sm.) Clauz. & Vezda

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Vigo (TORRENTE & EGEA, 1989), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

Schismatomma graphidoides (Leighton) Zahlbr.

As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981).

SCLEROPHYTON Eschw. (1824)

Sclerophyton circumscriptum (Taylor) Zahlbr.

Corrubedo (EGEA, 1989).

SCOLICIOSPORUM Massal. (1852)

Scoliciosporum pruinosum (P. James) Vezda

Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Silvoso (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Moreda (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Moreda, ponte de Folgoso a Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992a).

Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold

Salcedo, A Caeira, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Bacidia umbrina* Branth & Rostr.?), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Caaveiro, A Coruña (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

SOLORINA Ach. (1808)

Solorina crocea (L.) Ach.

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985).

Solorina saccata (L.) Ach.

Comarca Compostelana (TEXIDOR, 1869, como *Peltigeria s.* DC.), inmediaciones de Carballo (Leg. Seoane), Santiago de Compostela (Leg. Texidor) (COLMEIRO, 1889), A Rogueira (CARBALLAL *et al.*, 1985).

SPHAEROPHORUS Pers. (1794)

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.

A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Pico da Edreira, O Carballiño (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vainio

Picos de Ancares (NAVÁS, 1904, como *S. coralloides* Pers.), Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927), A Fracha (ABBAYES, 1945), río Deo (DALDA, 1972, como *S. coralloides* Pers.), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Sphaerophorus globosus var. *curtus* (Hook. & Taylor) Zahlbr.

Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

SPHINCTRINA Fr. (1828)

Sphinctrina leucopoda Nyl.

A Capela (ETAYO *et al.*, 1991).

Sphinctrina tubiformis Massal.

Pedra do Lagarto, Catoira, Cangas (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *S. microcephala* Nyl.), Carballera no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, As Cavadas (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1987).

SPIILONEMA Bornet. (1856)

Spilonema revertens Nyl.

Cerredo (VALCÁRCEL *et al.*, 1993)

SQUAMARINA Poelt (1958)

Squamaria cartilaginea (With.) P. James

A Rogueira [CARBALLAL *et al.*, 1985, como *S. crassa* (Huds.) Poelt].

Squamaria lamarckii (DC.) Poelt

Galicia (AMO Y MORA, 1870, como *Parmelia lagascae* Fr.), Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *S. lagascae* Nyl.).

STEREOCAULON Hoffm. (1796)

Stereocaulon dactylophyllum Flörke

Vigo (LÁZARO-IBIZA, 1898, como *S. corallinum* E. Fr.), Pico de Ancares (NAVÁS, 1904, como *S. corallinum* Fr.).

Stereocaulon evolutum Graewe

Pena Trevinca (CARBALLAL *et al.*, 1985), Monte Xesteiras, Pico da Edreira, Monte de Fermuriz, areal de Cabanas, Cuntis (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

Comarca Compostelana (TEXIDOR, 1869, como *S. pascale* L.), Lugo (LANGE, 1860), preto de Lugo (AMO Y MORA, 1870), preto de Lugo (Leg. Lange), inmediaciones de Santiago de Compostela (Leg. Texidor), Vigo (Leg. Lazaro) (COLMEIRO, 1889).

Stereocaulon pileatum Ach.

A Fracha, Vigo, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *S. pileatum* f. *sorediiferum* Nyl.).

***Stereocaulon tomentosum* Fr.**

Pena Trevinca, Monte Pedroso (CARBALLAL *et al.*, 1985).

***Stereocaulon vesuvianum* Pers.**

Praia de Lourido (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *S. denudatum* Flörke).

***STICTA* (Schreber) Ach. (1803)**

***Sticta fuliginosa* (Hoffm.) Ach.**

Baiona (LÁZARO-IBIZA, 1898), Cangas, Monte Galiñeiro, Monte de A Fracha, Armenteira, Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Regueiro de Reboredo, Carballeira Arroio Perreira, de Ordes a Carral (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), A Capela (ETAYO *et al.*, 1991), Naraxa (VALCÁRCEL *et al.*, 1993), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Sticta limbata* (Sm.) Ach.**

Monte Galiñeiro, Dena, Armenteira, Catoira (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Vigo (DEGELIUS, 1935), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian (CRESPO *et al.*, 1983), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira, Seoane (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), A Ribeira Grande (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991), Pambre (ETAYO *et al.*, 1991).

***Sticta sylvatica* (Huds.) Ach.**

Santiago de Compostela (Leg. Colmeiro), Ferrol (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889), Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral (CRESPO *et al.*, 1981), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1989), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), de Folgoso a la Pendella (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b), Pambre, Castro de Lobos (ETAYO *et al.*, 1991),

Gaxate-Verducido (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Mangüeiro (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

STRANGOSPORA Körber (1860)

***Strangospora microhaema* (Norman) R. Anderson**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b).

***Strangospora pinicola* (Massal.) Körber**

Pontevedra (CARBALLAL *et al.*, 1983), A Coruña (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990).

TELOSCHISTES Norman (1853)

***Teloschistes chrysophthalmus* (L.) Th. Fr.**

Pedra do Lagarto, A Lanzada (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Borrera chrysophthalma* Ach.), Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Vigo, A Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988).

***Teloschistes flavicans* (Swartz) Norman**

Pico Sacro (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia f. DC.*), Monte Lobeira (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

TEPHROMELA M. Choisy (1929)

***Tephromela atra* (Huds.) Hafellner ex Kalb [= *Lecanora a.* (Huds.) Ach.]**

Monte Galiñeiro, A Fracha, Cangas, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, como *Lecanora aff. a.*), Corrubedo, Cabo Estai, Fisterra (BAHILLO *et al.*, 1987), Seoane, A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1990), Ferrol (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), A Rogueira (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a).

THELENELLA Nyl. (1855)

Thelenella modesta (Nyl.) Nyl.

Monforte de Lemos [ALVAREZ & CARBALLAL, 1989, como *Microglaena m.* (Nyl.) A. L. Sm.].

THELOPSIS Nyl. (1855)

Thelopsis rubella Nyl.

Quiñones de León (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987a).

THELOTREMA Ach. (1803)

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

Monte do Castro (ALVAREZ & CARBALLAL, 1987b), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & IGLESIAS, 1989), Corga da Aguasenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

TONINIA Massal. (1856)

Toninia aromatica (Turner ex Sm.) Massal.

Mogor, Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

Toninia plumbina (Anzi) Hafellner & Timdal

De Folgoso a Pendella [ALVAREZ & CARBALLAL, 1991b, como *Bacidia p.* (Anzi) R. Sant.].

TRAPELIA M. Choisy (1929)

Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy

Redondela, Dena (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea c.* Nyl.), Corrubedo (BAHILLO et al., 1987), A Fonsagrada (VALCÁRCEL et al., 1992), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

Trapelia involuta (Taylor) Hertel

A Caeira, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Lecidea coarctata* Nyl. var. *glebulosa* (Crombie?)), Pambre (ETAYO et al.,

1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

Trapelia obtegens (Th. Fr.) Hertel

Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA et al., 1992).

Trapelia placodiooides Coppins & P. James

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

TRAPELIOPSIS Hertel & G. Schneider (1980)

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James

Entre Xermiñas e Agromaior, preto a Central de Meirama, Carballeira de Antemil, Casas de Borducedo Grande, Castiñeira, Casal (CRESPO et al., 1981, como *Lecidea aeruginosa* Borrer in Hook. & Sow.), Pazos de Borbén (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Rebolás, Central do Eume, Ombre, Porto da Gañidoira, Lanzós, Parga (CARBALLAL et al., 1991b).

Trapeliopsis viridescens (Schrader) Coppins & P. James

Preto de Lugo (Leg. L. Seoane) [COLMEIRO, 1889, como *Lecidea v.* (Schrader) Ach.]. COLMEIRO (1889) sinonimiza este taxon con *Biatora vernalis* (forma) Fr. y *Lecidea sphaeroides* Schaer. En la actualidad son tres táxones, que pueden aparecer sobre troncos podridos, por lo que esta cita es ambigua.

TYLOTHALLIA P. James & Kiliás (1981)

Tylothallia biformigera (Leighton) P. James & Kiliás

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES, 1992).

UMBILICARIA Hoffm. (1789)

Umbilicaria cinereorufescens (Schaerer) Frey

Cerrodo (VALCÁRCEL et al., 1992).

***Umbilicaria crustulosa* (Ach.) Frey**

Silvela (PÉREZ *et al.*, 1991).

***Umbilicaria grisea* Hoffm.**

Monte do Piñor (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

***Umbilicaria nylanderiana* (Zahlbr.) H. Magn.**

Monte Castelo (ABBAYES, 1945, como *Gyrophora n.* Zahlbr.).

***Umbilicaria polyphylla* (L.) Baumg.**

Cumio de Xesteiras, Pena (CARBALLAL *et al.*, 1991a), Silvela (PÉREZ *et al.*, 1991).

***Umbilicaria polyrrhiza* (L.) Fr.**

Lugo (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *Umbilicariap.* Sten.), Monte Galiñeiro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Gyrophora p.* Körber), Torrón (CARBALLAL *et al.*, 1991a), parte alta subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Umbilicaria spodochroa* (Ehrh. ex Hoffm.) DC.**

Monte Galiñeiro, A Fracha (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Gyrophora s.* Ach.), Os Ancares (CODOGNO & SANCHO, 1991), Pena da Moura (ETAYO *et al.*, 1991), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), San Martín de Suarna (PÉREZ *et al.*, 1991), parte alta subida al Millao (GARCÍA-MOLARES & MARTÍNEZ, 1993).

***Umbilicaria torrefacta* (Lightf.) Schrad.**

Os Ancares (CODOGNO & SANCHO, 1991).

USNEA Hill (1753)

***Usnea articulata* (L.) Hoffm.**

Baamonde (MAHEU & GILLET, 1922), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), entre Xermiñas e Agromaior (CRESPO *et al.*, 1981), Castro de Lobos (ETAYO *et al.* (1991)).

***Usnea barbata* (L.) Weber in Wigg.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *U. barbata* D.C.), Pico Sacro (LANGE, 1860), preto de Cuntis

(Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *U. barbata* Fr. Schaer.), Carteire (SEIJAS, 1952), río Deo (DALDA, 1972). Todas las citas son de atribución dudosa a especies actuales.

***Usnea ceratina* Ach.**

Xesta, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Usnea cornuta* Körber**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Monte da Arca Aberta, Casas de Borducedo Grande, Regueiro Valado (CRESPO *et al.*, 1981, como *U. inflata* Delise), Couto de Chaian, Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983, como *U. inflata* Delise), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988, 1989, como *U. inflata* Delise), Pico Sacro (CARBALLAL *et al.*, 1991a, como *U. inflata* Delise), Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Louseiras, A Hermida, Belesar, Parga (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Monte do Porte (ETAYO *et al.*, 1991), Ourense (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1992), Aranza, Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén-Moscoso, Freaza, Sotomayor, Ventín-Broullosa, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992), Campelo (BAHILLO & LÓPEZ DE SILANES, 1993).

***Usnea filipendula* Stirton**

Rubiás (Leg. Colmeiro), Pico Sacro (Leg. Lange) (COLMEIRO, 1889, como *U. barbata* Fr. Schaer. var. *dasypoga* Fr. Schaer.), Lestedo (BELLOT, 1952, como *U. barbata* L. var. *dasypoga* Ach.), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977, como *U. dasypoga* (Ach.) Röhl.).

***Usnea flammea* Stirton**

Monte do Porte, Pambre (ETAYO *et al.*, 1991), Campelo, Amoedo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Usnea florida* (L.) Wigg.**

Lugo (MAHEU & GILLET, 1922), Monte de Castro (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *U. florida* Web.), Montes do Invernadeiro (CASTROVIEJO, 1977), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira, de Ordes a Carral, Monte da Arca Aberta, Regueiro Valado, Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Monte do Porte, Pambre, Castro de Lobos (ETAYO *et al.*, 1991), Anceu, Campelo, A Laxe, Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Usnea fulvoreagens* (Räsänen) Räsänen**

Aranza, Campelo (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Aranza, Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén-Moscoso, Sotomayor, Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1992), Corga da Aguacenza (CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Usnea hirta* (L.) Wigg.**

Gaxate-Verducido (BAHILLO & CARBALLAL, 1991).

***Usnea lapponica* Vainio**

Cuntis (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

***Usnea longissima* Ach.**

Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira no Regueiro de Pereira, Regueiro Valado, Aquela Banda (CRESPO *et al.*, 1981).

***Usnea madeirensis* Motyka**

Ventín de Arriba, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1991), Campelo (CLERC, 1991), Campelo, O Couso, Ventín de Arriba (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Usnea plicata* (L.) Weber in Wigg.**

Monte Galiñeiro, Cangas, Dena, Catoira, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

***Usnea rubicunda* Stirton**

Ría de Vigo (DELZENNE & GEHU, 1978, como *U. rubiginea*), Regueiro de Reboredo, entre Xermiñas e Agromaior, Carballeira de Antemil, Carballeira no Regueiro de Pereira (CRESPO *et al.*, 1981), Couto de Chaian, Couto de Couso (CRESPO *et al.*, 1983), Bentín (CASARES, 1986), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1989), Porto da Gañidoira, Curro de Caudaoso, Belesar (CARBALLAL *et al.*, 1991b), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991b), Anceu, Aranza, Campelo, O Couso, Gaxate-Verducido, A Laxe, Pazos de Borbén-Moscoso, San Amaro, Sotomayor, Ventín-Broullosa (BAHILLO & CARBALLAL, 1992).

***Usnea subfloridana* Stirton**

Montes do Invernadeiro [CASTROVIEJO, 1977, como *U. comosa* (Ach.) Röhl.], Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987a), A Guía (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1987b), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1989), Pico Sacro (CARBALLAL *et al.*, 1991a).

***Usnea wasmuthii* Räsänen**

Aranza, Campelo, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1991, 1992).

***Usnea wirthii* Clerc**

Gaxate-Verducido, Xesta (BAHILLO & CARBALLAL, 1991, 1992).

VERRUCARIA Schrader (1794)

***Verrucaria acrotella* Ach.**

Preto de Ferrol (COLMEIRO, 1889, como *V. macularis* Schaer. var. *acrotella* Schaer.), Monte Pedroso (SÁNCHEZ-BIEZMA & LÓPEZ DE SILANES, 1992).

***Verrucaria hochstetteri* Fr.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Verrucaria hydrela* Ach.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a), San Cristobo (PÉREZ *et al.*, 1991).

***Verrucaria margacea* (Wahlenb.) Wahlenb.**

Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Verrucaria maura* Wahlenb.**

Mogor, Portocelo (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Punta de Rande, Punta Corveiro dos Castros, Punta da Congorza, Samil (ARDRÉ, 1957), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ría de Camariñas (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1963), Ría de Arosa (DONZE, 1968), San Cibrao (ANADÓN *et al.*, 1979; POLO *et al.*, 1979), Costa de Camariñas (PÉREZ-CIRERA & MALDONADO, 1982), Ría de Lires (PÉREZ-CIRERA & PACHECO, 1985), Boiro, Corrubedo (BAHILLO *et al.*, 1987).

***Verrucaria muralis* Ach.**

Mollabao (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Caaveiro (LÓPEZ DE SILANES & CARBALLAL, 1991a).

***Verrucaria nigrescens* Pers.**

Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

***Verrucaria striatula* Wahlenb. ex Ach.**

A Coruña (Leg. Degelius) (SANTESSON, 1939).

***Verrucaria viridula* (Schrader) Ach.**

Mollabao, A Seca (SAMPAIO & CRESPI, 1927).

XANTHORIA Th. Fr. (1860)

***Xanthoria candelaria* (L.) Th. Fr.**

Padrón, Caldas de Reis (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia c.* Nyl.), Pontevedra, A Caeira, A Parda, Pedra do Lagarto (SAMPAIO & CRESPI, 1927, como *Placodium*

candelarium Wigg.), río Deo (DALDA, 1972, como *X. lychnea* Fr.).

***Xanthoria ectanoides* (Nyl.) Zahlbr.**

Ribeira Pequena [CARBALLAL & LÓPEZ DE SILANES, 1991, como *X. parietina* (L.) Th. Fr. ssp. *ectanea* (Ach.) Clauz. & Roux].

***Xanthoria elegans* (Link) Th. Fr.**

Galicia (Leg. L. Seoane) (COLMEIRO, 1889, como *Placodium e.* DC.), A Fonsagrada (VALCÁRCEL *et al.*, 1992).

***Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.**

Galicia (COLMEIRO, 1851, como *Parmelia p.* Ach.), Galicia (Leg. Colmeiro) (COLMEIRO, 1889, como *Physcia p.* Nyl.), Pedra do Lagarto, A Lanzada, Catoira, A Parda (SAMPAIO & CRESPI, 1927), Ribadeo (ABBAYES, 1945), Punta do Cabalo, Punta de Rande, Punta da Congorza, Punta Corveiro dos Castros (ARDRÉ, 1957), Ría do Barqueiro (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1962), Ría de Camariñas (FISCHER-PIETTE & SEOANE-CAMBA, 1963), Casas de Borducedo Grande (CRESPO *et al.*, 1981), Costa de Camelle (PÉREZ-CIRERA & MALDONADO, 1982), Ría de Lires (PÉREZ-CIRERA & PACHECO, 1985), Vigo (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1986, 1987a), Fisterra, Boiro, Illas Sisargas, Cabo Estai (BAHILLO *et al.*, 1987), Monforte de Lemos (ALVAREZ & CARBALLAL, 1988), Pontevedra (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1988), A Coruña, San Gregorio (CARBALLAL *et al.*, 1991a), A Coruña (CARBALLAL *et al.*, 1990), Moredo (ALVAREZ & CARBALLAL, 1991a), Ferrol, Fene (CARBALLAL & GARCÍA-MOLARES, 1991), Ferrol, Pontevedra (GARCÍA-MOLARES & CARBALLAL, 1993).

XYLOGRAPHA Th. Fr. (1838)

***Xylographa vitiligo* (Ach.) Laundon**

De Cortes a Lousadela (ALVAREZ & CARBALLAL, 1992b).

Nombres dudosos

¿Diploschistes cinereocaesius G. Samp.?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

¿Girardia cantabrica G. Samp.?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

¿Lecanora celestini G. Samp.?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

¿Lecanora limica B. de Lesd. & G. Samp.?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

¿Lecidea leucocephala Schaeerer?

COLMEIRO (1889)

¿Parmelia saccatiloba Taylor?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

¿Phycia hypoleuca Tuck.?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

¿Pyrenopsis calvosina G. Samp.?

SAMPAIO & CRESPI (1927)

Lista de localidades citadas

A Agüeira (Becerreá, Lu), 29TPH54.

A Caeira (Poio, Po), 29TNG2898.

A Capela (Toques, C), 29TNH8258, 440 m.

A Coruña capital, C, 29TNJ4802.

A Ermida (Xermade, Lu), 29TNJ9609, 450 m.

A Fonsagrada, Lu, 29TPH5776, 960 m.

A Fracha (Pontevedra-Cotobade-Ponte Caldelas, Po), 29TNG3394.

A Fraga (O Covelo, Po), 29TNG5985, 820 m.

A Guarda, Po, 29TNG1039 = La Guardia.

A Guía (Vigo, Po), 29TNG2579.

A Lanzada (Sanxenxo-O Grove, Po), 29TNG1099.

A Laxe (Fornelos de Montes, Po), 28TNG5386 = Laxe.

A Parda (Pontevedra, Po), 29TNG3097.

A Pobra de Burón (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5578, 700 m.

A Ribeira Grande, Montes do Invernadeiro (Vilaríño de Conso, Or), 29TPH4165, 900 m.

A Rogueira (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH5420, 1000 m.

A Seca (Pontevedra, Po), 29TNG3098.

Abegondo (Abegondo, C), 29TNH5485.

Acevo (Ribeira de Piquín, Lu), 29TPH6579, 1030 m.= Acebo

Aguiño (Ribeira, C), 29TNH7851.

Aguiño, C, 29TNH9806.

Alto do Boi (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH4812, 1061 m. = Alto del Buey.

Altos da Aguacenza-Serra da Queixa (Chandrex da Queixa, Or), 29TPG3472, 1500 m. Altos da Aguacenza-Montes de Invernadeiro (Chandrex da Queixa, Or),= Altos del Guasenza.

Amoedo (Pazos de Borbén, Po), 29TNG3782.

Anceu (Ponte Caldelas, Po), 29TNG4487 = Anceo.

Andrade (Ponte Caldelas, C), 29TNJ0470.

Anllo, Or.

Antemil (Carballeira de, Cerceda, C), 29TNH4283.

Aquela Banda, Sarandóns (Abegondo, C), 29TNH5486 = Aquelabanda

Aranza (Soutomaior, Po), 29TNG3785.

Areal de Cabanas (Cabanas, C), 29TNJ6707.

Armenteira (Meis, Po), 29TNG2101.

As Achas, As (A Cañiza, Or), 29TNG5973 = Achas

- As Cavadas, Rodís (Cerceda, C), 29TNH5585 = Las Cabadas.
- As Pontes de García Rodríguez (As Pontes de García Rodríguez, C), 29TNJ91.
- Baamonde (Begonte, Lu), 29TPH0181.
- Baiona, Po, 29TNG1293 = Bayona.
- Barbeitos (Fonfría, A Fonsagrada, Lu), 29TPH6180, 900 m.
- Barbudo (Ponte Caldelas, Po), 29TNG4389.
- Belesar (Chantada, Lu), 29TPH0192, 480 m.
- Bemantes (Miño, C), 29TNG6698, 170 m.
- Bentín (Ames, C), 29TNH3647, 215 m.
- Betanzos (C), 29TNH6492.
- Boiro, C, 29TNH0918.
- Borrón, (Pontevedra, Po), 29TNG2998.
- Brins, Figueiras (Santiago de Compostela, C), 29TNH3451.
- Buisán, río (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5466, 460 m.
- Buriz (Guitiriz, Lu), 29TNH9279, 505 m.
- Caaveiro (A Capela, C), 29TNJ7607.
- Cabalo branco, cerca de Ferrol, C, 29TNJ1663.
- Cabo Estai, Canido (Vigo, Po), 29TNG1568 = Cabo Estay.
- Cabo Silleiro (Baiona, Po), 29TNG0859.
- Cabo Vilán, (Camariñas, C), 29TMH8278 = Cabo Vilano.
- Cacheiras (Teo, C), 29TNH3741.
- Calvos (Fornelos de Montes, Po), 29TNG4681.
- Cambre (C), 29TNH5594, 65 m.
- Camelle (Costa de, Camariñas, C), 29TMH98.
- Campelo, Xesta (A Lama, Po), 29TNG5487, 720 m.
- Campo da Cruz, Viveirón (Muras, Lu), 29TPJ1011, 560 m.
- Canegas (Po), 29TNG1779.
- Cañas (Carral, C), 29TNH5387.
- Carballeira de San Lorenzo (Santiago de Compostela, C), 29TPH1763, 250 m.
- Carballo, C, 29TNH2584.
- Carracedo, O Padrón (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5576, 750 m.
- Carteire (Palas de Rei, Lu), 29TPH0051.
- Casal, Ordes (Ordes, C), 29TNH5285.
- Casas de Borducedo Grande, alrededores Meirama, C, 29TNH5477.
- Casa Grande, (Cabanas, C), 29TNJ60.
- Caseiro (entre Caseiro y Belecón), Santa María de Nieva (Avión, Or), 29TNG5988, 760 m.
- Castiñeira, Leira (Ordes, C), 29TNH4695.
- Castro, Galegos (Frades, C), 29TNH5466, 350 m.
- Castro de Baroña (Porto do Son, C), 29TNH9723.
- Castro de Lobos, Paradela (Toques, C), 29TNH8564, 620 m = Castrolobo.
- Castrosebil (Monte), Sebil, Ciquiril (Cuntis, Po), 29TNH31 = Castrosibil.
- Castroverde (Castroverde, Lu), 29TPH3665.
- Catoira, Po, 29TNH2324.
- Cedeira (C), 29TNJ73.
- Cee, C, 29TNH9253.
- Central de Meirama (Cerceda, C), 29TNH4282, 360 m.
- Central Eume, As Neves (A Capela, C), 29TNJ7706, 335 m.
- Cerrodo, Vieiro (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5172, 1000 m.
- Chaian (Couto de), (Trazo, C), 29TNH3855.
- Chapela (Redondela, Po), 29TNG279.
- Condoniñas, Boimente (Viveiro, Lu), 29TPJ1827, 360 m.
- Corga da Aguacenza (Chandrexá da Queixa-Vilaríño de Conso, Or), 29TPG3772, 1000 m = Barranco de Guasenza.
- Corgo do Cernadiño, Montes do Invernadeiro (Vilaríño de Conso, Or), 29TPG4364, 1200 m = Arroyo Cernadino.
- Corrubedo (Ribeira, C), 29TMH9214.
- Cortes, Seceda (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH4420, 600 m.

- Cospeito, Lu, 29TPH1547, 420 m.
- Couso (Couto de) (Coristanco, C), 29TNH3532.
- Cruzul, Becerreá, Lu.
- Cuntis, Po, 29TNH31.
- Curro da Capelada (Cedeira, C), 29TNJ8036, 510 m.
- Curro de Caudaoso, As Lobeiras, Miñotos (Ourol, Lu), 29TPJ3245, 660 m.
- de Cortes a Lousadela, Seceda (Folgoso do Courel, Lu).
- de Folgoso a Pendella, Folgoso (Folgoso do Courel, Lu). 29TPH4816, 500 m.
- de Ordes a Carral, Alrededores Meirama, C, 29TNH4976.
- Dena (Meaño, Po), 29TNG1599.
- Eiriz, Folgoso (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH4717, 620 m.
- Escourido, Piñeira (A Fonsagrada, Lu), 29TPH4972, 600 m = Courido.
- Estaca de Bares, C, 29TPJ0449.
- Fene, C, 29TNJ6714.
- Fentosa, Seixido (A Lama, Po), 29TNG5299, 690 m.
- Ferrol, C, 29TNJ6212, 15 m.
- Fisterra, C, 29TMH7748.
- Fornelos de Montes, Po, 29TNG4783, 340 m.
- Fornos da Cal, Suarna (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5876, 780 m.
- Fraga Redonda, Eume (As Pontes de García Rodríguez, C), 29TNJ8207, 480 m.
- Freaza (Fornelos de Montes, Po), 29TNG4279 = Pazos de Fraeza
- Froxán, Folgoso (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH4412, 480 m.
- Gaxate (A Lama, Po), 29TNG4885.
- Godóns (despues de) (O Covelo, Po), 29TNG5783, 680 m.
- Grañas, Pousada (Sobrado, C), 29TNJ9926, 520 m.
- Guilfonso, Xestoso (Monfero, C), 29TNJ7804, 460 m.
- Guntimil (Xinzo de Limia, Or), 29TPH0352.
- Hospital, Fonsagrada, Lu, 29TPH5174, 1102 m.
- Igrexafeita (San Sadurniño, C), 29TNJ7917, 280 m.
- Illa de Ons (Bueu, Po), 29TNG08-29TNG09.
- Illas Sisargas (Malpica, C), 29TNH9908.
- Lagoa de Antela (Xinzo de Limia, Or), 600 m.
- Lanzós (Vilalba, Lu), 29TPJ1206, 680 m.
- Lestedo (Boqueixón, C), 29TNH4339.
- Lourido (Nigrán, Po), 29TNG2797.
- Lourizán (Pontevedra, Po), 29TNG2793.
- Louseiras (Muras, Lu), 29TPJ0121, 540 m.
- Lugo capital, Lu, 29TPH1763.
- Malpica (Malpica de Bergantiños, C), 29TNH1596.
- Mangüero, Abelenda (Avión, Or), 29TNG5892, 480 m.
- Manzaneda (Manzaneda, Or), 29TPG4179, 2000 m.
- Marcón, (Pontevedra, Po), 29TNG3196.
- Marín (Po), 29TNG2989.
- Meirama (preto a Central) (Cereda, C), 29TNG4780.
- Meirama, Igrexario (Cereda, C), 29TNH4584, 220 m.
- Mercurín, Seoane (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH5122, 650 m.
- Merza (Vila de Cruces, Po), 29TNH6136.
- Mesón do Vento, Ardemil (Ordes, C), 29TNH5279, 440 m.
- Millao (parte alta de la subida), Avión, Or, 29TNG5669, 990 m.
- Millao (subida al), Avión, Or, 29TNG5791, 810 m.
- Mogor, Po, 29TNG2492.
- Mollabao (Pontevedra, Po), 29TNG2897.
- Mondariz, Po, 29TNG4475.
- Moneixas (Lalín, Po), 29TNH7221.
- Monforte de Lemos, Lu, 29TPH2209, 400 m.

- Monte Alegre (Ourense, Or).
 Monte Carballeira, C, 29TNJ9512, 650 m.
 Monte Castro (Viveiro, Lu).
 Monte da Arca Aberta (Carral, C), 29TNH4981.
 Monte da Fracha (Pontevedra-Cotobade-Ponte Caldelas, Po), 29TNG3394.
 Monte de Cebreros, (Pedrafita do Cebreiro, Lu), 29TPH6132.
 Monte de San Ciprián, Po, 29TNG3666.
 Monte do Castro (Vigo, Po), 29TNG2477, 143 m.
 Monte do Dono, Alrededores Meirama, C, 29TNH5889.
 Monte do Marmoiral (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5778, 960 m.
 Monte do Piñor, Or, 29TNG98.
 Monte do Porte, Palas de Rei, Lu, 29TNH8847, 480 m (?Andemil).
 Monte Fermuriz, C.
 Monte Galiñeiro (Gondomar-Vigo, Po), 29TNG2465.
 Monte Lobeira (Vilanova de Arousa, Po), 29TNH1912.
 Monte Pedroso (Santiago de Compostela, C), 29TNH3551, 641 m.
 Montes da Ruña (Mazaricos, C), 29TMH7748.
 Montes de Carrio (Lalín-Vila de Cruces, Po), 29TNH7033.
 Montes de Lóuzara, Noceda (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH5128.
 Montes do Invernadeiro (Vilariño de Conso, Or), 29TPH3664.
 Montouto, Padrón (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5273, 870 m.
 Moreda, Seoane (Folgoso do Caurel, Lu), 29TPH5521, 700 m.
 Morgade, Or.
 Mourente (Pontevedra, Po), 29TNG3098.
 Naraxa, Vilabol (A Fonsagrada, Lu), 29TPH6072, 300 m.
 Neda, C, 29TNJ6817.
 Negueira de Muñiz, Lu, 29TPH7178, 300 m.
 O Carballiño, Or, 29TNG7598 = Carballino.
 O Couso, A Laxe (Fornelos de Montes, Po), 29TNG5385 = Couso.
 O Grove, Po, 29TNH1004.
 O Rocín (Manzaneda, Or), 29TPG3668, 1000 m.
 Oitavén (Fornelos de Montes, Po), 29TNG4386.
 Ombre (Pontedeume, C), 29TNJ6906, 60 m.
 Ordes, C, 29TNH4869, 290 m.
 Os Ancares, Lu, 950 m.
 Ourense capital, Or, 29TPG9489, 130 m.
 Ousón (Becerrea, Lu), 29TPH54.
 Pacios (Pedrafita do Cebreiro, Lu), 29TPH5627, 1060 m.
 Padrón, C, 29TNH2732.
 Pambre (castelo de) (Palas de Rei, Lu), 29TNH8844, 420 m.
 Parga (Guitiriz, Lu), 29TNH9280, 460 m.
 Pazos de Borbén, Oitavén, Po, 29TNG3882.
 Pazos de Borbén-Moscoso, Po, 2PTNG2983.
 Pedra do Lagarto (Pontevedra, Po), 29TNG3096.
 Pedrafita (Pedrafita do Cebreiro, Lu), 29TPH6132.
 Pedreira, Carballido (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5776, 960 m.
 Pedreira, Lu, 29TPJ0612, 650 m.
 Pena da Moura (Toques, C), 29TNG8261, 710 m.
 Pena Feixa (Monfero, C), 29TNH8198, 700 m.
 Pena Trevinca (A Veiga, Or), 29TPG8481, 2124 m.
 Pena, Or, 29TNG7688.
 Pico de Costoia (Avión-Beariz, Or).
 Pico Edreira (Avión, Or).
 Pico Sacro (Boqueixón, C), 29TNH4539.
 Pigarzos (cerca de), Xesta (A Lama, Po), 29TNG5393, 875 m.

- pista de Seoane a Visuña (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH5222, 700 m.
- Ponte Carreira, (C), 29TNH6163.
- Ponte Condesa, Po, 29TNG3095.
- Ponte de Folgoso a Seoane (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH5020, 500 m.
- Ponte de Froxán a Castro Portela (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH4412, 400 m.
- Ponte do Boadil, Negueira de Muñiz, LU, 29TPH6973, 300 m.
- Ponte Sampaio (Pontevedra, Po), 29TNG3288.
- Pontedeume (C), 29TNJ70.
- Pontevedra capital, Po, 29TNG2998.
- Porte, Lu, 29TNH8847.
- Portiño, Fornos de San Pedro, C, ?
- Porto da Gañidoira (Muras-Ouro, Lu), 29TPJ0615, 720 m = Alto da Gañidoira.
- Porto do Canizo (A Gudiña, Or), 29TPG5757.
- Portocelo (Marín, Po), 29TNG2393.
- Praia da Lagoa, Po, 29TNG1384.
- Praia de Lourido, Po, 29TNG2797.
- Pravio, Cambre, C, 29TNH5594, 65 m.
- Présaras (Vilasantar, C), 29TNH4170, 260 m.
- Punta Agueiras, O Grove, Po, 29TNH0401.
- Punta Corveiros dos Castros, Nerga (Cangas, Po), 29TNG1477.
- Punta da Congorza (Cangas, Po), 29TNG1777.
- Punta de Rande (Redondela, Po), 29TNG2881.
- Punta do Cabalo, ría de Vigo, Po, 29TNG3086.
- Punta Pesqueira, Po.
- Queixada (Manzaneda, Or), 29TPG4179, 2000 m.
- Queixas (Cereda, C), 29TNH4176, 320 m.
- Quiñones de León (Parque de) (Vigo, Po), 29TNG2375, 14 m.
- Rebolás (Ortigueira, C), 29TNJ9126, 340 m.
- Redondela, Po, 29TNG3281.
- Regueiro de Pereira (Carballeira no, Pereira, C), 29TNH4481 = Arroyo Pereira.
- Regueiro Reboredo, Ordes (Ordes, C), 29TNH4472 = Arroyo Reboredo.
- Regueiro Valado, Ordes (Ordes, C), 29TNH4669 = Arroyo Balado.
- Retorta, Vilabol (A Fonsagrada, Lu), 29TPH6073, 300 m.
- Ría de Arousa, límite provincial Po y C,
- Ría de Camariñas, C, 29TMH87.
- Ría de Cedeira, C
- Ría de Corme-Laxe, C, 29TNH08-29TNH09.
- Ría de Lires (Cee, C).
- Ría de Vigo, Po.
- Ría do Barqueiro, límite provincial Po y C.
- Ribadeo, Lu, 29TPJ5822.
- Ribeira Pequena, Montes do Invernadeiro (Vilaríño de Conso, Or), 29TPH3664, 1000 m.
- Ribeira, C, 29TNH0105.
- Rieiro, Bruicedo (A Fonsagrada, Lu), 29TPH4972, 600 m.
- Río Baldeiras (orillas), Avión, Or, 29TNG6391, 310 m.
- Río Beduido, Alrededores Meirama, C, 29TNH4074.
- Río Deo, C.
- Río Imuno.
- Río Ulla (tierras de), límite provincial C y Po.
- Río Vilaframil (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5784, 480 m.
- Río Vilardongo (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5474, 850 m.
- Rodeiro, Abelenda (Avión, Or), 29TNG5791, 580 m.
- Rubianes, Lu, 29TPH2167.
- Rubiás (Lugo, Lu), 29TPH26.
- Salcedo (O Covelo, Po), 29TNG2995.
- Samil (Vigo, Po), 29TNG1873.

- San Amaro (Meaño, Po, 29TNG4483.
- San Cibrao (Cervo, Lu), 29TPJ2640.
- San Ciprián (Po).
- San Cristobo, Cuíñas (A Fonsagrada, Lu, 29TPH5571, 500 m.
- San Gregorio, Fiolloedo (Salvaterra do Miño, Po), 29TNG4159.
- San Martín de Suarna (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5975, 600 m.
- San Pedro, Neiro (A Fonsagrada, Lu), 29TPH5679, 680 m.
- San Vicente, O Grove, Po, 29TNG3086.
- Santa Cruz do Salto (Cabanas, C.).
- Santa Mariña do Vilar (Ferrol, C.).
- Santiago de Compostela, C, 29TPH1763, 250 m.
- Sanxenxo, Po, 29TNG1694.
- Sarandóns (Abegondo, C), 29TNH5485, 80 m.
- Seoane (Folgoso do Courel, Lu), 29TPH5222, 800 m.
- Serra de Muradal, Fonsagrada, Lu, 29TPH5075, 1111 m.
- Silvela, Suarna (A Fonsagrada, Lu), 29TPH6078, 900 m.
- Silvoso, A Insua (Ponte Caldelas, Po), 29TNH3789.
- Taboada, C, 29TNJ7206, 330 m.
- Torrón, Or, 29TNG7288.
- Trazo, C, 29TNH4064, 300 m.
- Tui, Po, 29TNG2955.
- Ventín-Broullosa (Fornelos de Montes, Po), 29TNG4485.
- Ventín de Arriba (Fornelos de Montes, Po), 29TNG4872.
- Verducido (A Lama, Po), 29TNG4884.
- Vigo, Po, 29TNG2579.
- Vilaboa (C), 29TNJ4802.
- Vilalba, Lu, 29TPH0794.
- Vilanova de Arousa, Po, 29TNH1312.
- Vilarín de Baixo (A Fonsagrada, Lu), 29TPH6074, 400 m.
- Vilarín de Riba (A Fonsagrada, Lu), 29TPH6178, 800 m.
- Viveiro, Lu, 29TPJ13.
- Xallas, C, 29TNG1384.
- Xanceda (Mesía, C), 29TNH6268, 360 m.
- Xermiñas (entre Xermiñas e Agromaior), C, 29TNH4373.
- Xesta (A Lama, Po), 29TNG5387.
- Xesteiras, cerca de Cuntis, Po, 29TNH3324.
- Xiestas (baixada o regueiro) (A Lama, Po), 29TNG5591, 998 m.
- Xora (Coiros, C), 29TNH7588, 275 m.
- Zamáns (Vigo, Po), 29TNG2668, 460 m.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los miembros del equipo de liquenología: Aida García Molares, Graciela Paz Bermúdez, Carlos Pérez Valcárcel, M^a Jose Sánchez-Biezma Serrano, a Gustavo Renobales por sus comentarios sobre el primer manuscrito y a Gonzalo Navaza, por su orientación en la normalización de los topónimos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ABBAYES, DES H. (1945). Lichens d'Espagne récoltés de 1926 à 1935 par M. et Mme Allorge. *Rev. Bryol. et Lichénol.*, 15(1-2): 79-86.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1987a). Algunos líquenes de los parques urbanos de la ciudad de Vigo. *Actas VI Simp. Nac. Bot. Cript.*: 351-359.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1987b). Fragmenta Chorologica Occidentalicia (Lichenes, 896-916). *Anales Jard. Bot. Madrid*, 44(1): 151-153.

- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1988). Fragmenta Chorologica Occidentalia (Lichenes, 1297-1351). *Anales Jard. Bot. Madrid*, **45**(1): 290-294.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1989). Novedades para la flora liquénica gallega, II. *Studia Botanica*, **8**: 129-137.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1990). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 2566-2584. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **47**(2): 473-474.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1991a). Datos preliminares sobre la flora liquénica epífitica de la dehesa de La Rogueira, Sierra de Caurel, (Lugo, España). *N.A.C.C. (Bioloxia)*, **2**: 23-29.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1991b). Flora liquénica epífitica de la Sierra de Caurel (Lugo, Galicia, Noroeste de España). I. *Bol. Soc. Broteriana*, **64** (2^a serie): 213-220.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1992a). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 3848-3868. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **49**(2): 275-276.
- ALVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1992b). Líquenes y hongos liquenícolas interesantes de la Sierra de Caurel (Lugo, Noroeste de España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **13**(4): 359-369.
- AMO Y MORA, M. (1870). *Flora criptogámica de la Península Ibérica*. (Líquenes) 298-450.
- ANADÓN, R., GILI, C., GUASCH, E., OLIVELLA, I., POLO, L. & ROS, J. (1979). Distribución del poblamiento bentónico en una zona intermareal de la costa cantábrica gallega. *Actas I Simp. Ibér. de Bentos*: 673-710.
- ARDRÉ, F. (1957). Florule hivernale de la Ría de Vigo. *Rev. Algol. N. S.*, **3**: 135-146.
- BAHILLO, L. & CARBALLAL, R. (1991). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 3467-3499. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **49**(1): 113-115.
- BAHILLO, L. & CARBALLAL, R. (1992). La alianza *Usneion barbatae* Ochsner 1928 en la cuenca del río Oitavén (Pontevedra, NO de España). *N.A.C.C. (Bioloxía)*, **3**: 37-48.
- BAHILLO, L. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1993). *Maronetum constantis* Crespo et al. ex Bahillo et Lopez de Silanes «nov.ass.» comunidad pionera heliófila corticícola del sector Galaico-Portugués de la provincia Cántabro-Atlántico. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **14**(2): 179-188.
- BAHILLO, L., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1987). Flora liquénica de los roquedos marítimos gallegos. *Actas VI Simp. Nac. Bot. Cript.*: 361-370.
- BARRENO, E. & VAZQUEZ, V. M. (1981). *Coelocaulon crespoae* Barreno & Vázquez sp. nova (Lichenes). Notas sobre la flora liquénica de brezales españoles. *Lazaroa*, **3**: 235-246.
- BELLOT, F. (1952). Anotaciones a la flora criptogámica gallega. II. *Trab. Jard. Bot. Santiago*, **6**: 17-29.
- BOSTEL, A. (1900). *Nouvelle flore des lichens*. Ed. Librairie Générale de l'Enseignement. Paris.
- CANNON, P. F., HAWKSWORTH, D. L. & SHERWOOD-PIKE, M. A. (1985). *The British Ascomycotina. An annotated Checklist*. Commonwealth Mycological Institute. British Mycological Society. Kew.
- CARBALLAL, R., BRAVO, I. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1983). Novedades para la flora liquénica gallega. *Lazaroa*, **5**: 277-281.
- CARBALLAL, R., FRAGA, J. A., GARCÍA-MOLARES, A. & REINOSO, J. (1991a). A colección de musgos, hepáticas e líquenes de López Seoane e Hult. *Publicaciones da Área de Ciencias Bioloxicas, Seminario de Estudios Galegos*. Santiago de Compostela. 58 pp.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1986). Líquenes epífitos como indicadores de la contaminación atmosférica. I. Utilización del índice de pureza atmosférica (IPA) en la ciudad de Vigo (España). *Revista de Biología*, **13**: 33-41.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1987a). Líquenes epífitos como indicadores de la contaminación atmosférica II. Utilización de una escala cualitativa en la ciudad de Vigo (España). *Lazaroa*, **10**: 243-251.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1987b). Fragmenta Chorologica Occidentalia (Lichenes), 917-927. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **44**(1): 154-155.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1988). Aceramiento a las comunidades liquénicas epífitas del entorno urbano de la ciudad de Pontevedra (NO de España). *Bol. Soc. Broteriana*, **61** (2^a serie): 49-60.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1989). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 1852-1866). *Anales Jard. Bot. Madrid*, **45**(2): 521-523.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1991). Valoración de la contaminación atmosférica por SO₂ en la zona de Ferrol-Fene (La Coruña) mediante líquenes epífitos. *Acta Bot. Malacitana*, **16**(1): 197-206.
- CARBALLAL, R. & GARCÍA-MOLARES, A. (1992). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 3869-3904. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **49**(2): 276-279.
- CARBALLAL, R., GARCÍA-MOLARES, A. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1991). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 2996-3019. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **48**(2): 228-230.
- CARBALLAL, R., IGLESIAS, R. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1990). Delimitación de áreas de isocontaminación atmosférica en la ciudad de La Coruña. *N.A.C.C. (Bioloxía)*, **1**: 19-24.

- CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1985). Estudio base para la valoración de la contaminación atmosférica en la ciudad de Santiago mediante bioindicadores líquénicos. *Trab. Compostelanos Biol.*, **11**: 147-154.
- CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1991). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 2949-2995. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **48**(2): 224-227.
- CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1992). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 4050-4080. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **50**(1): 92-93.
- CARBALLAL, R., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & BAHILLO, L. (1985). Fragmenta Chorologica Occidentalia (Lichenes): 46-72. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **42**(1): 236-238.
- CASARES, M. (1986). *Schedae exsiccatae permutatione lichenologia. Fasciculum I. Fol. Bot. Misc.*, **5**: 79-84.
- CASASECA, B. (1960). *Estudio de la vegetación y flora del término municipal de Santiago de Compostela*. Tesis Doctoral.
- CASTROVIEJO, S. (1977). *Estudio de la vegetación de la Sierra de Invernadeiro (Orense)*. Icona, Ministerio de Agricultura. Madrid.
- CLERC, Ph. (1991). *Usnea madeirensis* Mot. (ascomycète lichénisé): une espèce méconnue de l'Europe et de l'Amérique du Nord. *Candollea*, **46**: 427-438.
- CODOGNO, M. & SANCHO, L. G. (1991). Distribution patterns of the lichen family *Umbilicariaceae* in the W Mediterranean Basin (Iberian Peninsula, S France and Italy). *Bot. Chron.*, **10**: 901-910.
- COLMEIRO, M. (1851). Recuerdos botánicos de Galicia. *Revista Matritense de Formación Práctica y Química Industrial*, **1**: 309-323.
- COLMEIRO, M. (1889). *Enumeración y revisión de las plantas de la Península hispano-lusitánica e Islas Baleares* (Tomo V, Líquenes : 758-875). Madrid.
- CRESPI, L. (1930). Notas liquenológicas. El género *Rhizocarpon*. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **30**: 261-269.
- CRESPO, A., BARRENO, E., SANCHO, L. G. & BUENO, A. G. (1981). Establecimiento de una red de valoración de pureza atmosférica en la provincia de La Coruña (España) mediante bioindicadores líquénicos. *Lazaroa*, **3**: 289-311.
- CRESPO, A., BARRENO, E. & SANCHO, L. G. (1983). Esbozo de la vegetación líquénica de algunas localidades de los valles del Tambre y Ulla (La Coruña, España). *Trab. Compostelanos Biol.*, **10**: 97-108.
- DALDA, J. (1972). *Vegetación de la Cuenca del río Deo (Cuenca alta del Mandeo)*. Monografía de la Universidad de Santiago de Compostela nº 6.
- DEGELIUS, G. (1935). Das ozeanische element der strauch- und laubflechtenflora von Skandinavien. *Acta Phytogeographica Suecica*, **7**: 1-411.
- DEGELIUS, G. (1954). The lichen genus *Collema* in Europe: morphology, taxonomy and ecology. *Simb. Bot. Upsal.*, **13**(2): 1-499.
- DELZENNE, CH. & GEHU, J. M. (1978). Sur deux associations epiphytes du *Parmelia caperatae* des plaines et collines françaises. *Documents Phytosociologiques*, **2**: 117-126.
- DIEDERICH, P., SÉRUSIAUX, E. & BOOM, P. VAN DEN (1991). Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou intéressants pour la flore de la Belgique et des régions voisines. *V. Lejeunia*, **136** (nouvelle série): 1-47.
- DONZE, M. (1968). The algal vegetation of the Ria de Arosa (NW, Spain). *Blumea*, **16**(1): 159-192.
- EGAN, R. S. (1987). A Fifth checklist of the lichen-forming, lichenicolous and allied fungi of the continental United States and Canada. *The Bryologist*, **90**(2): 77-173.
- EGAN, R. S. (1989). Changes to the «Fifth checklist of the lichen-forming, lichenicolous and allied fungi of the continental United States and Canada». Edition I. *The Bryologist*, **92**(1): 68-72.
- EGEA, J. M. (1984). Contribución al conocimiento del género *Caloplaca* Th. Fr. en España: Especies saxícolas. *Collectanea Botanica*, **15**: 173-204.
- EGEA, J. M. (1989). Las comunidades líquénicas saxícolas ombrófobas, litorales, del suroeste de Europa y Norte de África (*Roccelletea phycopsis* classis prov.). *Studia Geobotanica*, **9**: 73-152.
- EGEA, J. M. & TORRENTE, P. (1993). *Crespnea* a new genus of lichenized fungi in the order Arthoniales (Ascomycotina). *Mycotaxon*, **48**: 301-331.
- ERIKSSON, O. & HAWKSWORTH, D. L. (1986 a). An alphabetical list of the generic names of ascomycetes. *Systema Ascomycetum*, **5**: 3-111.
- ERIKSSON, O. & HAWKSWORTH, D. L. (1986 b). Notes on ascomycete systematics, nº 1-224. *Systema Ascomycetum*, **5**: 113-174.
- ERIKSSON, O. & HAWKSWORTH, D. L. (1986 c). The names of accepted orders of ascomycetes. *Systema Ascomycetum*, **5**: 175-184.
- ERIKSSON, O. & HAWKSWORTH, D. L. (1986 d). Outline of the ascomycetes. *Systema Ascomycetum*, **5**: 185-324.
- ETAYO, J., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & BAHILLO, L. (1991). Contribución a la flora líquénica de Galicia Central-Tras os Montes. I. N.A.C.C. (Bioloxia), **2**: 31-39.

- FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE-CAMBA, J. (1962). Ecologie de la ria type: la Ría del Barquero. *Bull. Inst. océanogr. Monaco*, **1244**: 1-36.
- FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE-CAMBA, J. (1963). Examen écologique de la Ria de Camariñas. *Bull. Inst. océanogr. Monaco*, **61**(1277): 1-38.
- FOLLMANN, G. (1973). Beobachtungen zum Vorkommen spanischer Flechten. I. Der Formenkreis um *Ramalina siliquosa* (Huds.) A. L. Sm.. *Philippia*, **2**(1): 3-12.
- GARCÍA-MOLARES, A. & CARBALLAL, R. (1993). Algunos líquenes y hongos interesantes del Noroeste de la Península Ibérica. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **14**(1): 69-75.
- GARCÍA-MOLARES, A. & MARTÍNEZ, J. (1993). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 4465-4507. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **51**(1): 124-126.
- HAFELLNER, J. (1993). Die Gattung *Pyrrhospora* in Europa. *Herzogia*, **9**: 725-747.
- HANKO, B. (1983). Die Chemotypen der Flechtengattung *Pertusaria* in Europa. *Bibliotheca Lichenologica*, **19**: 340 pp. J. Cramer. Vaduz.
- HAWKSWORTH, D. L., JAMES, P. W. & COPPINS, B. J. (1980). Checklist of British lichen-forming, lichenicolous and allied fungi. *Lichenologist*, **12**(1): 1-115.
- KEISSLER, K. (1930). Die Flechten parasiten. *Rabenhorst's Kryptogamenflora*, **8**: 1-712.
- KEISSLER, K. (1938). Pyrenulaceae bis Mycorporaceae. Coniocarpineae. *Rabenhorst's Kryptogamenflora*, **9** 1(2): 1-846.
- KEISSLER, K. (1960). Usneaceae. *Rabenhorst's Kryptogamenflora*, **9**, 5(4).
- LANGE, J. (1860). Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit J. Lange - Nat. Foren. Vidensk. Meddel. Hafnie.
- LÁZARO-IBIZA, B. (1898). Nota sobre algunos líquenes de España y Portugal. *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* (Dic): 200-205.
- LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1987). Líquenes epífitos de Caaveiro, La Coruña (España), I. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **8**(4): 359-367.
- LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1989). Líquenes con cianofíceos de Caaveiro, La Coruña (NO de España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **10**(3): 247-252.
- LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1991a). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 3101-3151. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **48**(2): 237-240.
- LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1991b). Líquenes epífitos de la Fraga de Caaveiro (La Coruña, España), II. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **12**(1): 47-54.
- LÓPEZ DE SILANES, M. E. & IGLESIAS, R. (1989). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 1867-1883. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **45**(2): 523-524.
- MAHEU, J. & GUILLET, A. (1922). Contribution à la connaissance de la lichénologie espagnole. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **22** (8): 349-357.
- MAYRHOFER, H., MATZER, M., SATTLER, J. & EGEA, J. M. (1993). A revision of the Atlantic-Mediterranean *Rinodina beccariana* and related taxa (lichenized Ascomycetes, Physciaceae). *Nova Hedwigia*, **57** (3-4): 281-304.
- NAVÁS, L. (1901). Notas liquenológicas, II. El género *Parmelia* en España. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **1**(8): 310-317.
- NAVÁS, L. (1903). Notas liquenológicas, III. La *Lecanora subfuscata* en España. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **3**(7): 285-290.
- NAVÁS, L. (1904). Notas liquenológicas, IV. Los Cladoniáceos de España. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **4** (5): 226-236.
- NIMIS, P. L. (1993). *The lichens of Italy. An annotated catalogue*. Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino. 897 pp.
- OZENDA, P. & CLAUZADE, G. (1970). *Les lichens. Etude biologique et flore illustrée*. Ed. Masson et cie. Paris. 802 pp.
- PÉREZ, C., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1991). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 3433-3466. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **49**(1): 110-113.
- PÉREZ-CIRERA, J. L. (1975). Notas sobre la vegetación ficológica bentónica de la Ría de Cedeira (NO de España). *Anal. J. Bot. Cavanilles*, **52**: 161-171.
- PÉREZ-CIRERA, J. L. (1976). Tipos de vegetación bentónica y cormofítica litoral del Noroeste de España (Ría de Corme y Lage). *Documents Phytosociologiques*, F. **15-18**: 87-122.
- PÉREZ-CIRERA, J. L. & MALDONADO, J. L. (1982). Principales tipos de vegetación bentónica y su zonación en el litoral comprendido entre las rías de Camariñas y de Corme y Lage (Costa de Camelle, La Coruña). *Collectanea Botanica*, **13**(2): 893-910.
- PÉREZ-CIRERA, J. L. & PACHECO, J. (1985). Zonación y distribución geográfica de la vegetación bentónica de la ría de Lires (NO, España). *Trab. Compostelanos Biol.*, **12**: 153-183.
- POELT, J. (1969). *Bestimmungsschlüssel Europäischer flechten*. Ed. J. Cramer. Lehrer.
- POELT, J. & VEZDA, A. (1977). *Bestimmungsschlüssel Europäischer flechten*. Ergänzungsheft I. J. Cramer. Vaduz.
- POELT, J. & VEZDA, A. (1981). *Bestimmungsschlüssel Europäischer flechten*. Ergänzungsheft II. J. Cramer. Vaduz.

- POLO, L., OLIVELLA, L., GILI, C., ANADÓN, R., CARBONELL, J., ALTIMIA, C. & Ros, J. D. (1979). Primera aportación a la sistemática de la flora y fauna bentónicas del litoral de San Ciprián de Burela (Lugo, Galicia). *Actas I Simp. Ibér. de Bentos*.
- PURVIS, O. W., COPPINS, B. J., HAWKSWORTH, D. L., JAMES, P. W. & MOORE, D. M., (Ed.) (1992). *The lichen flora of Great Britain and Ireland*. Natural History Museum Publications, 710 pp.
- PURVIS, O. W., COPPINS, B. J. & JAMES, P. W. (1993). Checklist of lichens of Great Britain and Ireland. *Br. Lich. Soc. Bull.*, **72** (Suppl.): 1-75.
- SAMPAIO, G. & CRESPI, L. (1927). Líquenes de la Provincia de Pontevedra. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **24**: 136-151.
- SÁNCHEZ-BIEZMA, M. J., CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1992). Algunos líquenes interesantes saxícolas del Monte Pedroso, Santiago, La Coruña (Galicia, España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*, **13**(4): 327-333.
- SÁNCHEZ-BIEZMA, M. & LÓPEZ DE SILANES, M. E. (1992). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 4081-4099. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **50**(1) : 93-95.
- SANTESSON, R. (1939). Amphibious pyrenolichens I. *Arkiv für Botanik*, **29** A (10): 1-67.
- SANTESSON, R. (1984). *The lichens of Sweden and Norway*. Swedish Museum of Natural History. 333 pp. Stockholm and Uppsala.
- SEIJAS VÁZQUEZ, E. (1952). Contribución al catálogo de la flora de Lugo. *Trab. Jard. Bot. Santiago*, **6**: 31-61.
- SEOANE, J. (1960). Comunidades algales de la Ría de Vigo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* **58**(1): 371-374.
- SEOANE-CAMBA, J. (1969). Sobre la zonación del sistema litoral y su nomenclatura. *Investigación pesquera*, **33**(1): 261-267.
- SMITH, A. L. (1918). *A monograph of the British lichens. Part I*. British Museum, London.
- SMITH, A. L. (1926). *A monograph of the British lichens. Part II*. British Museum, London.
- TEXIDOR, J. (1869). Apuntes para la flora de España o lista de plantas no citadas y raras de Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Anales de las Ciencias*, **18** (8,9): 83 pp.
- TORRENTE, P. & EGEA, J. M. (1989). La familia *Opegraphaceae* en el Área Mediterránea de la Península Ibérica y Norte de África. *Bibliotheca Lichenologica*, 282 pp. J.Cramer.
- TORRENTE, P. & EGEA, J. M. (1991). *Llimonaea*, a new genus of lichenized fungi in the order *Opegraphales* (Ascomycotina). *Nova Hedwigia*, **52**(1-2): 239-245.
- TORRENTE, P. & EGEA, J. M. (1992). New species of *Opegrapha* from South-Western Europe and Northern Africa. *Mycotaxon*, **45**: 83-92.
- VALCÁRCEL, C. P., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1991). Los géneros *Cladina* y *Cladonia* (Lecanorales) en el municipio de Fonsagrada (Lugo). *N.A.C.C. (Bioloxia)*, **2**: 13-21.
- VALCÁRCEL, C. P., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1992). Fragmenta Chorologica Occidentalia (Lichenes): 4294-4335. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **50**(2): 251-253.
- VALCÁRCEL, C. P., LÓPEZ DE SILANES, M. E. & CARBALLAL, R. (1993). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes, 4508-4530. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **51**(1): 127-128.
- ZSCHACKE, H. (1933-34). *Epigloeaceae, Verrucariaceae und Dermatocarpaceae. Rabenhorst's Kryptogamenflora*, **9**(1): 44-695.

ÍNDICE

- abietinum (Calicium)* 59
- ACAROSPORA** 54
- acerina (Bacidia)* 57
- achristotera (Lecidella)* 79
- ACROCORDIA** 54
- acrotella (Verrucaria)* 111
- actinostomus (Diploschistes)* 70
- actophila (Lecanora)* 75
- aculeata (Cetraria)* 68
- aculeatum (Coelocaulon)* 68
- ADELOLECIA** 54

- adglutinata (Hyperphyscia)* 73
- adglutinata (Physciopsis)* 73
- adnata (Micarea)* 81
- adscendens (Endocarpon)* 71
- adscendens (Physcia)* 98
- aenea (Porina)* 100
- aeruginosa (Lecidea)* 109
- aethalea (Buellia)* 58
- agelaea (Phlyctis)* 97
- aiolia (Physcia)* 98
- alba (Rinodina)* 105

albeocaerulescens (Lecidea) 101
albeocaerulescens (Porpidia) 101
Albertii 54
albescens (Lecanora) 75
albescens (Pertusaria) 93
alcicornis 65
ALECTORIA 54
aleurites (Imshaugia) 74
aleurites (Parmeliopsis) 74
allophana (Lecanora) 75
alpicola (Cenomyce) 66
alpina (Pertusaria) 94
amara (Pertusaria) 94
ambigua (Parmeliopsis) 92
AMPHILOMA 60, 61
amplissima (Lobaria) 82
ANAPTYCHIA 54
anastomosans (Gyalideopsis) 73
androgyna (Ochrolechia) 85
anguina (Graphina) 72
ANISOMERIDIUM 55
anomaea (Cladonia) 67
anomala (Buellia) 58
anomaloides (Lecidella) 78
antecellans (Arthopyrenia) 56
antecellens (Arthopyrenia) 56
aphtosa (Peltigera) 93
aquila (Physcia) 54
aractina (Caloplaca) 60
arborea (Ochrolechia) 85
arbuscula (Cladonia) 83
arceutina (Bacidia) 57
argena (Phlyctis) 97
argentata (Lecanora) 75
armorica (Ramalina) 102
arnoldii (Parmelia) 87
arnoldii (Parmotrema) 87
aromatica (Toninia) 109
ARTHONIA 55
ARTHOPYRENIA 56
ARTHOTHELIUM 56
articulata (Usnea) 110
ASPICILIA 56
astroidea (Physcia) 98
atlantica (Degelia) 69
atlantica (Parmeliella) 69
atlantica (Ramalina) 102
atomariooides (Catillaria) 62

atra (Lecanora) 108
atra (Opegrapha) 85
atra (Tephromela) 108
atrocinerea (Rinodina) 105
atroflava (Caloplaca) 60
atrogrisea (Bacidia) 57
atropurpurea (Catillaria) 62
atropurpurea (Catinaria) 62
atrosanguinea (Lecidella) 80
atroviridis (Lecidea) 79
aurantia (Caloplaca) 60
aurantiaca (Xanthocarpia) 60
aurantium (Amphiloma) 60
aurata (Pseudocypsellaria) 101
aurella (Candelariella) 61
auriculatum (Collema) 68
auriforme (Collema) 68
austrosinensis (Parmotrema) 87

BACIDIA 57
badia (Buellia) 58
badia (Protoparmelia) 101
radioatum (Rhizocarpon) 104
BAEOMYCES 57
barbata (Usnea) 110
bauschiana (Micarea) 83
bellidiflora (Cladonia) 64
bellum (Nephroma) 84
BIATORA 58
BIATORELLA 100
biforme (Anisomeridium) 55
biformigera (Tylothallia) 109
biformis (Lejophlebia) 55
bitteriana (Hypogymnia) 74
biuncialis 68
BLASTENIA 60, 61
borreri (Parmelia) 100
borreri (Porina) 100
botryosa (Lecidea) 79
bouteillei (Fellhanera) 72
bouteillei (Catillaria) 72
brebissonii (Leptogium) 81
BRYORIA 58
BUELLIA 58
burnetiae (Leptogium) 81
BYSSOLOMA 59

- caesia (Physcia)* 98
caesiocinerea (Aspicilia) 56
caesioplumbeus (Diploschistes) 70
caesiopruinosa 98
caesium (Leptogium) 81
caespiticia (Cladonia) 64
calcarea (Opegrapha) 86
calicaris (Ramalina) 102
CALICIUM 59
CALOPLACA 60
campestris (Lecanora) 76
canaliculata 102
CANDELARIA 61
candelaria (Physcia) 61
candelaria (Xanthoria) 112
CANDELARIELLA 61
candelaris (Chrysotrix) 63
candelaris (Lepraria) 63
candelarium (Placodium) 112
canescens (Diploicia) 70
canina (Peltigera) 93
caperata (Parmelia) 88
caperata (Pseudoparmelia) 88
capitata 103
CARBONEA 62
carneoalbida (Bacidia) 58
carneoalbida (Biatora) 58
carneola (Pachyphiale) 87
carneopalida (Pertusaria) 94
carpinea (Lecanora) 76
carporrhizans (Parmelia) 90
carrollii (Japewia) 74
carrollii (Lecidea) 74
cartilaginea (Squamaria) 107
castanea 54
CATAPYRENIUM 62
CATILLARIA 62
CATINARIA 62
cavata (Acrocordia) 54
CENOMYCE 64,65,66,67,68
cenotea (Cladonia) 64
cerasi (Arthopyrenia) 56
ceratina (Usnea) 110
cerina (Caloplaca) 60
cerinella (Caloplaca) 60
cervicornis (Cladonia) 64
cervina (Lecanora) 54
CETRARIA 63
cetrata (Parmelia) 90
CETRELIA 63
- ceuthocarpa (Pertusaria)* 95
CHAENOTHECA 63
chalybeia (Catillaria) 62
chalybeiformis (Bryoria) 58
chinense (Parmelia) 89
CHIODECTON 63
chlariotera (Lecanora) 76
chlanotha (Phaeophyscia) 97
chlorococca (Lauderlindsaya) 75
chlorococca (Sphaerulina) 75
chloromelum (Leptogium) 81
chlorophaea (Cladonia) 64
chlorophana (Acarospora) 54
chlorophana (Lecanora) 54
chlorophylla (Cetraria) 63
chlorophylla (Tuckermannopsis) 63
chloropoliza 62
chlorospila (Pyrenula) 102
chlorotica (Porina) 100
chordalis 66
chrysoleuca (Rhizoplaca) 104
chrysoleuca (Squamaria) 104
chrysoleucum (Psoroma) 58
chrysophaea (Ramonia) 104
chrysophtalma (Borrera) 108
chrysophtalmus (Teloschistes) 108
CHRYSOTRIX 63
ciliaris (Anaptychia) 54
ciliaris (Physcia) 54
ciliata (Cladina) 64
ciliata (Cladonia) 64
ciliata (Phaeophyscia) 97
cinerea (Aspicilia) 54
cinerea (Lecanora) 54
cinerea (Micarea) 83
cinereoatra (Porpidia) 101
cinereobadia 101
cinereopruinosa (Arthopyrenia) 56
cinereorufescens (Umbilicaria) 109
cinnabarina (Arthonia) 55
circumscriptum (Sclerophyton) 106
citrina (Caloplaca) 60
citrinum 61
CLADINA 63,66,67
CLADONIA 63
cladonioides 68
clavus (Biatorella) 106
clavus (Sarcogyne) 106
clementei (Physcia) 98
CLIOSTOMUM 68

coarctata (Lecidea) 109
coarctata (Trapelia) 109
coccifera (Cenomyce) 64
coccifera (Cladonia) 64
coccodes (Pertusaria) 94
cochleatum (Leptogium) 81
COELOCAULON 68
COLLEMA 68
collina (Peltigera) 93
communis (Pertusaria) 96
comosa (Usnea) 111
concolor (Candelaria) 61
conferta (Opegrapha) 86
confertoides (Opegrapha) 86
confinis (Lichina) 82
confinis (Rinodina) 105
confluens (Lecidea) 79
confluens (Opegrapha) 86
confragosa (Rinodina) 105
coniocraea (Cladonia) 64
coniops (Buellia) 58
conista (Cladonia) 64
conizaea (Lecanora) 76
conizaeoides (Lecanora) 76
conoidea (Cladonia) 66
conoplea (Pannaria) 87
conspersa (Parmelia) 88
constans (Maronea) 83
constrictum (Rhizocarpon) 104
convoluta (Cladonia) 64
corallina (Pertusaria) 94
corallinum (Stereocaulon) 107
coralliza (Candelariella) 61
coralloides (Sphaerophorus) 107
cornea (Pachyphiale) 87
CORNICULARIA 69
cornucopioides (Cladonia) 64
cornuta (Cladonia) 65
cornuta (Cenomyce) 65
cornuta (Usnea) 110
cornutoradiata 68
corregatum (Cliostomum) 68
crassa (Enterographa) 71
crassa (Squamaria) 107
crenularia (Caloplaca) 60
crespoae (Coelocaulon) 68
crinita (Parmelia) 88
crinitum (Parmotrema) 88
cristatum (Collema) 68
crocea (Solorina) 107

crustulata (Porpidia) 101
crustulosa (Umbilicaria) 110
cryptochlorophaea (Cladonia) 64
cupreogrisea (Aspicilia) 57
cupularis (Gyalecta) 73
curnowii (Ramalina) 102
curtus 107
cuspidata (Ramalina) 102
cyanescens (Leptogium) 81
cyathoides (Fuscidea) 72
cycloselis (Parmelia) 97
CYPHELIUM 69
cyrtella (Lecania) 75

dactylophyllum (Stereocaulon) 107
dasypoga (Usnea) 110
decipiens (Dermatocarpon) 70
decolorans (Schismatomma) 106
decorticata (Cenomyce) 65
decorticata (Cladonia) 65
deformis (Cladonia) 65
DEGELIA 69
degenii (Peltigera) 93
demangeonii (Phylliscum) 98
demissum (Lecidoma) 80
DENDRISCOCAULON 69
dendriscum (Polychidium) 100
dendritica (Graphis) 96
dendritica (Phaeographis) 96
denigrata (Micarea) 83
denudatum (Stereocaulon) 108
DERMATOCARPON 70
dichraea 68
didactyla (Peltigera) 93
didyma (Arthonia) 55
digitata (Cenomyce) 65
digitata (Cladonia) 65
diluta (Dimerella) 70
DIMERELLA 70
dimidata (Physcia) 98
DIPLOICIA 70
DIPLOSCHISTES 70
DIRINA 71
disciforme (Lopadium) 83
disciformis (Buellia) 58
discolor (Rinodina) 105
dispar (Pertusaria) 94
dispersa (Lecanora) 76
dissecta (Parmelia) 89

- dissecta* (*Parmelia*) 89
distorta (*Physconia*) 99
druidarum (*Ramalina*) 103
dubia (*Parmelia*) 91
dubia (*Physcia*) 98
- ectanea* 112
ectaneoides (*Xanthoria*) 112
efflorescens (*Rinodina*) 105
effusa (*Lecanora*) 78
EIGLERA 71
elaborata (*Enterographa*) 71
elaeochroma (*Lecidella*) 80
elaiena (*Physcia*) 73
elegans (*Arthonia*) 55
elegans (*Ggraphis*) 72
elegans (*Placodium*) 112
elegans (*Xanthoria*) 112
elongata 66
endiviaefolia (*Cenomyce*) 64
endiviaefolia (*Cladonia*) 65
ENDOCARPON 71
endochlora (*Parmelia*) 88
endophoenica (*Phaeophyscia*) 97
ENDOPYRENIUM 62
ENTEROGRAPHA 71
enteroleuca (*Lecidea*) 80
enteroxantha (*Physconia*) 99
EOPYRENULIA 71
EPHEBE 71
epidermidis (*Leptorhaphis*) 82
epiphyscia (*Arthonia*) 55
ericetorum (*Cetraria*) 63
ericetorum (*Tubercularia*) 58
erubescens (*Buellia*) 58
erysibe (*Lecania*) 75
erysibiooides (*Catillaria*) 62
erythrophaea (*Lecidea*) 79
euphorea (*Lecidea*) 80
EVERNIA 71
evolutum (*Stereocaulon*) 107
exalbescens (*Pertusaria*) 94
exasperata (*Parmelia*) 88
exasperatula (*Parmelia*) 88
excludens (*Pertusaria*) 95
exigua (*Lecidea*) 79
exigua (*Rinodina*) 105
expallens (*Lecanora*) 76
- faginea* (*Pertusaria*) 94
farinacea (*Hypogymnia*) 74
farinacea (*Ramalina*) 103
farrea (*Physcia*) 99
farrea (*Verrucaria*) 71
fasciculare (*Collema*) 68
fastigiata (*Ramalina*) 103
FELLHANERA 72
ferruginea (*Blastenia*) 60
ferruginea (*Caloplaca*) 60
ferruginea (*Lecanora*) 60
festiva (*Caloplaca*) 60
filipendula (*Usnea*) 110
fimbriata (*Cenomyce*) 65
fimbriata (*Cladonia*) 65
firma (*Cladonia*) 65
flaccidum (*Collema*) 68
flaccidum (*Lethagrium*) 68
flammea (*Usnea*) 110
flavicans (*Physcia*) 108
flavicans (*Teloschistes*) 108
flavida (*Eiglera*) 71
flavida (*Pertusaria*) 95
flavorubescens (*Caloplaca*) 60
flexuosa (*Trapeliopsis*) 109
floerkeana (*Cladonia*) 65
florida (*Usnea*) 111
flotowii (*Gyalecta*) 73
fluviatile (*Endocarpon*) 70
foliacea (*Cenomyce*) 65
foliacea (*Cladonia*) 65
foliosa 67
fragans (*Collema*) 68
fragilis (*Sphaerophorus*) 107
fraxinea (*Ramalina*) 103
friesiana (*Bacidia*) 57
frigida (*Ochrolechia*) 85
fritzei (*Gyalidea*) 73
fuciformis (*Roccella*) 105
fucoides (*Roccella*) 105
FULGENSIA 72
fulgida (*Fulgensia*) 72
fuliginosa (*Arthonia*) 55
fuliginosa (*Lecidea*) 79
fuliginosa (*Parmelia*) 89
fuliginosa (*Sticta*) 108
fulvoreagens (*Usnea*) 111
furcata (*Cenomyce*) 65
furcata (*Cladonia*) 65
furfuracea (*Chaenotheca*) 63

furfuracea (*Coniocybe*) 63
furfuracea (*Evernia*) 101
furfuracea (*Pseudevernia*) 101
furfuraceum (*Collema*) 68
furfuraceum (*Leptogium*) 81
fuscata (*Acarospora*) 54
fusca (*Anaptychia*) 54
fusca (*Physcia*) 54
fuscella (*Lecania*) 75
fuscescens (*Bryoria*) 58
FUSCIDEA 72
fuscoatra (*Lecidea*) 79
fuscocinerea (*Lecidea*) 106
fuscocinerea (*Schaereria*) 106
fuscorufescens (*Baeomyces*) 57

galactina (*Lecanora*) 75
galactites (*Arthonia*) 55
gangaleoides (*Lecanora*) 76
gelatinosum (*Leptogium*) 81
gemmata (*Acrocordia*) 54
gennari (*Rinodina*) 105
geographica (*Lecidea*) 104
geographicum (*Rhizocarpon*) 104
gibbosa (*Aspicilia*) 57
glabrata (*Lecanora*) 76
glabratula (*Parmelia*) 89
glaauca 64
glaauca (*Cladonia*) 66
glaauca (*Platismatia*) 100
glaucellum (*Calicium*) 60
glaucoatra (*Acarospora*) 54
glaucoatra (*Buellia*) 58
glaucolutescens (*Lecanora*) 76
glaucoma (*Lecanora*) 78
glaucum (*Platysma*) 100
glebulosa 109
globosus (*Sphaerophorus*) 107
globulifera (*Pertusaria*) 93
glomerata (*Pertusaria*) 95
gonophila (*Lecidea*) 79
gracilis (*Cenomyce*) 66
gracilis (*Cladonia*) 66
graniforme (*Cliostomum*) 68
graphidioides (*Schismatomma*) 106
GRAPHINA 72
GRAPHIS 72
gregaria (*Arhonia*) 55
grisea (*Physcia*) 99

grisea (*Physconia*) 99
grisea (*Umbilicaria*) 100
griseovirens (*Buellia*) 58
grossa (*Megalaria*) 83
grumulosa (*Lecanactis*) 75
GYALECTA 73
GYALIDEA 73
GYALIDEOPSIS 73
GYROPHORA 110

HAEMATOMMA 73
hagenii (*Lecanora*) 77
halodytes (*Arthopyrenia*) 102
halodytes (*Pyrenocollema*) 102
helicopis (*Lecanora*) 77
hemisphaerica (*Pertusaria*) 95
hepaticum (*Endopyrenium*) 62
heterochroa (*Pertusaria*) 95
HETERODERMIA 73
heteromorpha (*Opegrapha*) 86
hibernicum (*Leptogium*) 81
hirsuta (*Phaoephyscia*) 97
hirta (*Usnea*) 111
hispanica (*Lasallia*) 75
hispida (*Physcia*) 99
hispidula (*Chaenotheca*) 63
hochstetteri (*Verrucaria*) 111
holocarpa (*Caloplaca*) 61
horiza (*Lecanora*) 77
horizontalis (*Peltigera*) 93
horrescens (*Parmelia*) 89
horrescens (*Parmelina*) 89
humilis (*Cladonia*) 66
hungarica (*Caloplaca*) 60
hutchinsiae (*Enterographa*) 71
hydrela (*Verrucaria*) 112
hydrophila (*Porpidia*) 101
hymenea (*Pertusaria*) 95
HYMENELIA 73
hyperbolica (*Buellia*) 59
hyperelloides (*Calicium*) 60
hyperopta (*Parmeliopsis*) 92
HYPERPHYSIA 73
hypnorum (*Psoroma*) 102
HYPOCENOMYCE 74
HYPOGYMNIA 74
hypoprotocetrarica 102
HYPOTRACHYNA 90

- icmalea* (*Placynthiella*) 99
icmalea (*Saccomorpha*) 99
ilicina (*Arthonia*) 55
ilicinum (*Arthothelium*) 55
impolita (*Arthonia*) 55
impudens (*Lecanora*) 77
IMSHAUGIA 74
incana (*Lepraria*) 80
inconspicua (*Arthopyrenia*) 56
inflata (*Usnea*) 110
insulana (*Dirina*) 71
insularis (*Rimularia*) 104
intermutans (*Aspicilia*) 57
intumescens (*Lecanora*) 77
inundata (*Bacidia*) 57
inusta (*Phaeographis*) 96
involuta (*Trapelia*) 109
isidiotyla (*Parmelia*) 89
islandica (*Cetraria*) 63
islandica (*Physcia*) 63
italica (*Buellia*) 59
- jamesii* (*Lecanora*) 77
jamesii (*Parmeliella*) 92
JAPEWIA 74
jenensis (*Gyalecta*) 73
jorgei (*Buellia*) 59
jubata (*Alectoria*) 54
- laatokkaensis* (*Lecanora*) 77
labrosa 74
lychnea (*Xanthoria*) 112
lachneum (*Catapyrenium*) 62
lactea (*Buellia*) 59
lactea (*Lecidea*) 79
lactea (*Pertusaria*) 95
lacteola (*Lecidella*) 80
lacustris (*Hymenelia*) 73
laetevirens (*Lobaria*) 83
laetevirens (*Parmelia*) 89
laevigata (*Parmelia*) 89
laevigata (*Pertusaria*) 96
laevigatum (*Nephroma*) 84
laevis (*Lecanora*) 77
lagascae (*Parmelia*) 107
lagascae (*Squamaria*) 107
lanata (*Ephebe*) 71
lapicida (*Lecidea*) 79
- lapponina* (*Arthopyrenia*) 56
lapponica (*Usnea*) 111
LASALLIA 75
latebrarum (*Lepraria*) 75
laureri (*Catillaria*) 62
laureri (*Catinaria*) 62
laurocerasi (*Bacidia*) 57
LECANACTIS 75
LECANIA 75
LECANORA 75
lecanorodes (*Pertusaria*) 95
lecanorinum (*Rhizocarpon*) 104
LECIDELLA 79
lecideoides (*Lecanora*) 77
LECIDOMA 80
lectissima (*Porina*) 100
leioplaca (*Pertusaria*) 95
LEJOPHLEA 55
lenticularis (*Catillaria*) 63
lepadinum (*Thelotrema*) 109
LEPRARIA 80
leprarioides (*Haematomma*) 73
LEPROCAULON 81
LEPROLOMA 81
leptalea (*Porina*) 100
leptoclinoides (*Buellia*) 59
leptoclinoides (*Hafellia*) 59
LEPTOGIUM 81
LEPTORHAPHIS 82
leptospora (*Pertusaria*) 95
leptyrodes (*Lecanora*) 77
Lesdainii 54
LETHAGRIUM 68,69
leucoblepharum (*Byssoloma*) 59
leucomela (*Physcia*) 73
leucomelos (*Heterodermia*) 73
leucomelos (*Physcia*) 73
leucophaea (*Pannaria*) 87
leucophlebia (*Peltigera*) 93
leucoplaca (*Eopyrenula*) 71
leucopoda (*Sphinctrina*) 107
leucostoma (*Pertusaria*) 95
lichenoides (*Leptogium*) 81
lichenoides (*Opegrapha*) 86
LICHENOTHELIA 82
LICHINA 82
lightfootii (*Fuscidea*) 72
lignaria (*Micarea*) 84
limbata (*Sticta*) 108
limborina (*Rimularia*) 105

- LITHOGRAPHA** 82
lithophila (*Lecidea*) 79
lithyrga (*Opegrapha*) 86
littorea (*Caloplaca*) 61
LLIMONEA 82
LOBARIA 82
lobulatum (*Amphiloma*) 61
longissima (*Usnea*) 111
LOPADIUM 83
loxodes (*Parmelia*) 89
lucida (*Psilolechia*) 101
luganensis (*Physcia*) 97
lurida (*Lecidea*) 79
luridescens (*Rinodina*) 105
luridum (*Dermatocarpon*) 70
lusitana 88
lusitanica (*Protoblastenia*) 102
lusitanica (*Pyrrhospora*) 102
lusitanicum (*Nephroma*) 84
lutea (*Dimerella*) 70
lutulata (*Micarea*) 84
lyellii (*Phaeographis*) 97
lygaea (*Fuscidea*) 72
lygaea (*Lecidea*) 72
lyndsanyanum 104
- MACENTINA** 83
macilenta (*Cladonia*) 66
macrocarpa (*Lecidea*) 101
macrocarpa (*Porpidia*) 101
macrocarpum (*Anisomeridium*) 55
macrophylla (*Cladonia*) 66
macrospora (*Ochrolechia*) 85
macrospora (*Pyrenula*) 102
madeirensis (*Usnea*) 111
malacea (*Peltigera*) 93
margacea (*Verrucaria*) 112
marginatum (*Byssoloma*) 59
marina (*Caloplaca*) 61
MARONEA 83
massiliensis (*Dirina*) 71
maura (*Verrucaria*) 112
mediella (*Arthonia*) 55
mediterranea (*Cladina*) 66
mediterranea (*Cladonia*) 66
mediterranea (*Pannaria*) 87
MEGALARIA 83
melanochlora (*Pertusaria*) 95
MELASPILEA 83
melastigma (*Catillaria*) 62
membranacea (*Peltigera*) 93
membranaceum (*Leproloma*) 81
MENEGAZZIA 83
meridionalis (*Lecanora*) 77
meridionalis (*Parmelia*) 87
meroclorophaea (*Cladonia*) 64
metabasis 60
metacorallifera (*Cladonia*) 66
MICAREA 83
microcephala (*Sphinctrina*) 107
MICROGLAENA 109
microhaema (*Strangospora*) 108
microphylla (*Pannaria*) 87
microscopicum (*Leprocaulon*) 81
miniatum (*Dermatocarpon*) 70
mitis (*Cladina*) 66
mitis (*Cladonia*) 66
modesta (*Microglæna*) 109
modesta (*Thelenella*) 109
MOELLEROPSIS 84
montagnei (*Protoparmelia*) 101
mougeotii (*Parmelia*) 89
multipuncta (*Pertusaria*) 95
munda 92
murale (*Psoroma*) 77
muralis (*Lecanora*) 77
muralis (*Verrucaria*) 112
murorum (*Placodium*) 61
muscicola (*Polychidium*) 100
muscigena (*Physconia*) 99
muscorum (*Diploschistes*) 70
mycrophilloides (*Leptogium*) 81
myrinii (*Aspicilia*) 57
myriocarpa 69
myrticola (*Chiodecton*) 63
- naegelii* (*Bacidia*) 57
nanum (*Stereocaulon*) 81
nebulosa (*Moelleropsis*) 84
nebulosa (*Pannaria*) 84
neglecta (*Lepraria*) 81
NEPHROMA 84
nigrescens (*Collema*) 69
nigrescens (*Lethagrium*) 69
nigrescens (*Verrucaria*) 112
nigricans (*Phaeophyscia*) 97
nigroclavata (*Catillaria*) 63
nigrocruenta (*Porpidia*) 101

- nigrum** (*Placynthium*) 100
nitens (*Lecanora*) 77
nitida (*Pyrenula*) 102
nitidella (*Pyrenula*) 102
niveoatra (*Opegrapha*) 86
NORMANDINA 130
normoerica (*Cornicularia*) 69
notha 86
- obluridata** (*Lecidea*) 79
obscura 60
obscurata (*Heterodermia*) 73
obscurata (*Physcia*) 73
obscuratum (*Rhizocarpon*) 104
obscurella (*Caloplaca*) 61
obtegens (*Trapelia*) 109
occulta (*Buellia*) 59
occulta (*Llimonea*) 82
ochrochlora (*Cladonia*) 66
ochrocincta (*Opegrapha*) 86
OCHROLECHIA 85
ochroleucum (*Haematomma*) 73
ochrothalamia (*Melaspilea*) 83
olivacea 75
olivetorum (*Cetrelia*) 63
olivetorum (*Parmelia*) 63
olivieri 105
omphalodes (*Parmelia*) 89
OPEGRAPHA 85
OPHIOPARMA 86
orbicularis (*Phaeophyscia*) 97
orbicularis (*Physcia*) 97
orosthea (*Lecanora*) 77
oxydata (*Rinodina*) 105
- PACHYPHYALE** 87
palamaea 65
pallescens (*Ochrolechia*) 85
pallida (*Lecanora*) 77
pallidum (*Endocarpon*) 71
palmatum (*Leptogium*) 81
PANNARIA 87
papillaria (*Pycnothelia*) 102
parallela 86
parasema (*Buellia*) 58
parasema (*Lecidea*) 80
parasitica (*Cladonia*) 66
parella (*Ochrolechia*) 85
- parietina* (*Parmelia*) 112
parietina (*Placodium*) 112
parietina (*Xanthoria*) 112
parile (*Nephroma*) 84
PARMELIA 87
PARMELIELLA 92
PARMELINA 89
PARMELIOPSIS 92
PARMOTREMA 87,88,90
paschale (*Stereocaulon*) 107
pastillifera (*Parmelia*) 89
peliocarpa (*Micarea*) 84
peltata (*Rhizoplaca*) 104
PELTIGERA 93
perforata (*Parmelia*) 89
perisidiosa (*Physconia*) 99
perlata (*Parmelia*) 89
perlatum (*Parmotrema*) 90
pertusa (*Pertusaria*) 96
PERTUSARIA 93
peziziformis (*Cladina*) 66
peziziformis (*Cladonia*) 66
pezizoides (*Pannaria*) 87
phacodes (*Bacidia*) 57
PHAEOGRAPHIS 96
PHAEOPHYSCIA 97
PHLYCTIS 97
phycopsis (*Roccella*) 105
PHYLLISCUM 98
PHYSANCIA 98
PHYSCONIA 99
physodes (*Hypogymnia*) 74
physodes (*Parmelia*) 74
picea (*Protoparmelia*) 101
pilati (*Adelolecia*) 54
pileatum (*Stereocaulon*) 107
pilosella (*Parmelia*) 88
pineti (*Dimerella*) 70
pinicola (*Strangospora*) 108
pinnata 65
pityrea (*Pannaria*) 87
placiodoides (*Trapelia*) 109
PLACODIUM 91,72,112
PLACYNTIELLA 99
PLACYNTIUM 100
platycarpoides 101
platyphylla 54
PLATYSMA 63
plicata (*Usnea*) 111
plicatile (*Rhizocarpon*) 104

plumbea (Degelia) 69
plumbea (Parmeliella) 69
plumbella (Rinodina) 105
plumbina (Bacidia) 109
plumbina (Toninia) 109
pollinaria (Ramalina) 103
pollinii (Blastenia) 61
pollinii (Caloplaca) 61
POLYBLASTIA 100
polycarpon (Rhizocarpon) 104
POLYCHIDIUM 100
polychroa (Bacidia) 57
polydactyla (Cladonia) 67
polydactila (Peltigera) 93
polyphylla (Umbilicaria) 110
polyrrhiza (Gyrophora) 110
polyyrhiza (Umbilicaria) 110
polyspora (Rinodina) 105
polysporella (Buellia) 59
POLYSPORINA 100
polytropa (Lecanora) 78
ponojensis (Peltigera) 93
populina (Ramalina) 103
populorum (Bacidia) 57
PORINA 100
POROCYPHUS 100
PORPIDIA 101
portentosa (Cladonia) 67
praetermissa (Pannaria) 87
praetextata (Peltigera) 93
prasina (Micarea) 84
premnea (Lecanactis) 75
privigna (Sarcogyne) 106
prolifera 85
prolixa (Parmelia) 90
propagulifera (Heterodermia) 73
PROTOBLASTENIA 101
PROTOPARMELIA 101
protrusa (Lecidea) 80
pruinata 55
pruinosa (Biatorella) 106
pruinosum (Scoliosporum) 106
prunastri (Evernia) 71
psarophana (Lecanora) 101
PSEUDEVERNIA 101
pseudocorallina (Pertusaria) 96
PSEUDOCYPHELLARIA 101
PSEUDOPARMELIA 88
pseudoreticulata (Parmelia) 90
pseudoreticulatum (Parmotrema) 90

PSILOLECHIA 101
PSOROMA 102
PSOROTICHIA 100
pulchella (Normandina) 84
pulicaris (Lecanora) 78
pulicaris (Opegrapha) 86
pulla (Parmelia) 90
pulmonacea (Sticta) 82
pulmonaria (Lobaria) 82
pulmonaria (Sticta) 82
pulveracea (Lecidella) 80
pulveracea (Physconia) 99
pulverulenta (Physconia) 99
pulvinata 62,61
punctata (Buellia) 59
punctiformis (Arthopyrenia) 56
punctiformis (Buellia) 59
pungens 67
pusillum (Endocarpon) 71
pustulata (Lasallia) 75
pustulata (Pertusaria) 96
pustulata (Umbilicaria) 75
PYCNOTHELIA 102
pygmaea (Lichina) 82
PYRENOCOLLEMA 102
PYRENULA 102
PYRRHOSPORA 102
pyxidata (Cladonia) 67

quartzina (Lecanora) 75
quercicola (Lecanora) 78
quercina (Parmelia) 90
quercinum (Calicium) 60
quernea (Pyrrhospora) 102

racemosa 65
radiata (Arthonia) 55
RAMALINA 102
RAMONIA 104
ramulosa (Cladonia) 67
rangiferina (Cladonia) 67
rangiformis (Cladonia) 67
reagens 66,103
reflexa (Candelariella) 61
regularis (Sarcogyne) 106
rehmicus (Porocyphus) 100
rehmii (Psorotrichia) 100
reniformis (Arthonia) 55

- resupinata* (*Peltigera*) 84
resupinatum (*Nephroma*) 84
reticulata (*Parmelia*) 90
reticulatum (*Parmotrema*) 90
revertens (*Spilonema*) 107
revoluta (*Hypotrachina*) 90
revoluta (*Parmelia*) 90
RHIZOCARPON 104
RHIZOPLACA 104
RIMULARIA 104
RINODINA 105
riparium (*Rhizocarpon*) 104
rivulosa (*Lecidea*) 72
roboris (*Rinodina*) 105
robusta (*Parmelia*) 91
ROCCELLA 105
roseus (*Baeomyces*) 58
ruanum (*Arthothelium*) 56
rubella (*Bacidia*) 57
rubella (*Thelopsis*) 109
rubicunda (*Usnea*) 111
rubiginea (*Usnea*) 111
rubiginosa (*Pannaria*) 87
rufa (*Tubicularia*) 58
rufescens (*Catapyrenium*) 62
rufescens (*Peltigera*) 93
rufus (*Baeomyces*) 58
rugosella 76
runcinata (*Anaptychia*) 54
rupestris (*Protoblastenia*) 101
rupicola (*Lecanora*) 78
russula (*Protoblastenia*) 102
russula (*Pyrrospora*) 102

saccata (*Peltigeria*) 107
saccata (*Solorina*) 107
saepincolum (*Platisma*) 63
saligna (*Lecanora*) 78
sambuci (*Lecanora*) 78
sampaiana (*Pannaria*) 87
santorinensis (*Rinodina*) 105
SARCOGYNE 106
sarcogynoides (*Lecanora*) 79
sarcopsis 78
sermentosa (*Alectoria*) 54
saturninum (*Leptogium*) 82
saxatilis (*Parmelia*) 91
saxicola (*Squamaria*) 77
saxicola (*Caloplaca*) 61

scabra (*Lecidella*) 80
scalaris (*Hypocenmyce*) 74
schaereri (*Buellia*) 59
SCHAERERIA 106
SCHISMATOMMA 106
sciastrella (*Physcia*) 97
SCLEROPHYTON 106
SCOLICIOSPORUM 106
scopularia (*Lichenothelia*) 82
scopularis (*Caloplaca*) 61
scopulorum (*Ramalina*) 103
scripta (*Graphis*) 72
scrobiculata (*Lobaria*) 83
scrobiculata (*Sticta*) 83
scruposa (*Urceolaria*) 70
scruposus (*Diploschistes*) 70
scutata (*Peltigera*) 93
semipinnata (*Physcia*) 98
separans (*Aspicilia*) 57
sepincola (*Cetraria*) 63
sepulta (*Polyblastia*) 57
sessile (*Cyphelium*) 69
sienae (*Lecanora*) 77
siliquosa (*Ramalina*) 103
simplex 67
simplex (*Polysporina*) 100
sinuatum (*Leptogium*) 81
sinuosa (*Parmelia*) 91
smaragdula (*Acarospora*) 54
smithii (*Phaeographis*) 97
solenaria 54
SOLENOPSORA 75
SOLORINA 107
sophodes (*Lecanora*) 105
sophodes (*Rinodina*) 105
soredians (*Parmelia*) 91
sorediata 71
sorediata (*Meliella*) 91
sorediata (*Parmelia*) 91
sorediferum (*Stereocaulon*) 107
soredizodes (*Porpidia*) 101
sororia (*Buellia*) 59
spadicea (*Arthonia*) 56
spadicea (*Lecania*) 75
spadicea (*Solenopsora*) 75
speciosa (*Heterodermia*) 73
sphaerooides (*Biatora*) 58
sphaerooides (*Catillaria*) 58
SPHAEROPHORUS 107
sphaerosporum (*Rhizocarpon*) 104

- SPHAERULINA 75
SPHINCTRINA 107
SPILONEMA 107
spodochroa (*Umbilicaria*) 110
spuria (*Peltigera*) 93
SQUAMARINA 107
squamosa (*Cladonia*) 67
stellaris (*Arthonia*) 56
stellaris (*Cladina*) 67
stellaris (*Cladonia*) 67
stellaris (*Physcia*) 98
stellulata (*Buellia*) 59
stemonea (*Chaenotheca*) 63
stenophylla 92
STEREOCAULON 107
STICTA 108
stigonemoides (*Macentina*) 83
STRANGOSPORA 108
strepsilis (*Cladonia*) 67
strobilina (*Lecanora*) 78
stuppea (*Parmelia*) 91
subaurifera (*Parmelia*) 91
subcervicornis (*Cladonia*) 68
subconspersa 88
subdisciformis (*Buellia*) 58
subelevata (*Opegrapha*) 86
subfarinacea (*Ramalina*) 103
subflaccidum (*Collema*) 69
subfloridana (*Usnea*) 111
subfuscata (*Lecanora*) 75
subfuscata (*Bacidia*) 57
subfuscata (*Lecanora*) 57
subglaucescens (*Rinodina*) 105
subpallida (*Caloplaca*) 61
subpostumun (*Rhizocarpon*) 104
subrudecta (*Parmelia*) 91
subrugosa (*Lecanora*) 78
subsquamosa (*Cladonia*) 67
subulata (*Cladonia*) 68
subviridans 80
subviridis (*Ochrolechia*) 85
sulcata (*Parmelia*) 92
sulphurea (*Lecanora*) 78
swartzii (*Lecanora*) 78
sylvatica (*Cladonia*) 63
sylvatica (*Sticta*) 108
silvestris 63
symmicta (*Lecanora*) 78
symmictera (*Lecanora*) 78
syringea (*Lecania*) 75
szatalaënsis (*Ochrolechia*) 85
taediosum (*Arthothelium*) 56
tangeriensis (*Nephroma*) 84
taractica (*Parmelia*) 92
tartarea (*Ochrolechia*) 85
tavaresiana (*Dimerella*) 70
tavaresii (*Pannaria*) 87
taylorensis (*Parmelia*) 92
teicholyta (*Blastenia*) 61
teicholyta (*Caloplaca*) 61
TELOSCHISTES 108
tenebrosa (*Schaereria*) 106
tenella (*Physcia*) 99
tenuis 64
tenuissimum (*Leptogium*) 82
TEPHROMELA 108
terebrata (*Menegazzia*) 83
teretiusculum (*Leptogium*) 82
tesserata (*Lithographa*) 82
testacea (*Parmeliella*) 92
THELENELLA 109
THELOPSIS 109
tiliacea (*Parmelia*) 92
tinctina (*Parmelia*) 92
tinctoria (*Roccella*) 105
tomentosum (*Stereocaulon*) 108
TONINIA 109
torrefacta (*Umbilicaria*) 110
trachytallina (*Pertusaria*) 96
TRAPELIA 109
TRAPELIOPSIS 109
tremelloides (*Leptogium*) 81
tremulae (*Leptoraphis*) 82
tribacia (*Physcia*) 99
tribacioides (*Physcia*) 99
trichotera (*Parmelia*) 89
truncigena (*Gyalecta*) 73
tryptophylla (*Parmeliella*) 92
tubaeformis 65
TUBERCULARIA 58
tuberculata (*Roccella*) 106
tuberculosa (*Porpidia*) 101
tubiformis (*Sphinctrina*) 107
tubulosa (*Hypogymnia*) 74
tumidula (*Arthonia*) 55
tumidula (*Pertusaria*) 96

- turneri* (*Ochrolechia*) 85
TYLOTHALLIA 109
- uliginosa* (*Placynthiella*) 99
UMBILICARIA 109
umbrina (*Bacidia*) 106
umbrina (*Lecanora*) 78
umbrinum (*Scoliciosporum*) 106
umhaunse (*Dendriscocaulon*) 69
uncialis (*Cenomyce*) 68
uncialis (*Cladonia*) 68
undulatum (*Collema*) 69
URCEOLARIA 70
USNEA 110
- varia* (*Lecanora*) 78
varia (*Opegrapha*) 86
variolosa 95
venosa (*Peltigera*) 93
ventosa (*Lecanora*) 86
ventosum (*Haematomma*) 86
ventosum (*Ophioparma*) 86
venusta 99
vermicellifera (*Opegrapha*) 86
vernalis (*Biatora*) 58
vernalis (*Lecidea*) 58
VERRUCARIA 111
verrucariae (*Lecidea*) 79
verruculifera (*Parmelia*) 92
verruculosa (*Buellia*) 58
verticillata (*Cenomyce*) 64
verticillata (*Cladonia*) 64
vesuvianum (*Stereocaulon*) 108
- vicentina* (*Roccella*) 105
vinosa (*Arthonia*) 56
virens (*Lobaria*) 83
viridans (*Lecidella*) 80
viridescens (*Lecidea*) 109
viridescens (*Trapeliopsis*) 109
viridiattrum (*Rhizocarpon*) 104
viridula (*Verrucaria*) 112
vitellina (*Candelariella*) 62
vitellina (*Patellaria*) 62
vitellinaria (*Carbonea*) 61
vitellinula (*Caloplaca*) 61
vitellinula (*Xanthocarpia*) 61
vitiligo (*Xylographa*) 112
vittata (*Hypogymnia*) 74
vorticosa (*Carbonea*) 62
vorticosa (*Lecidea*) 62
vulgata (*Opegrapha*) 86
- wasmuthii* (*Usnea*) 111
weberi (*Dermatocarpon*) 70
wirthii (*Usnea*) 111
wulfenii (*Pertusaria*) 95
- XANTHOCARPIA** 60,61
XANTHORIA 112
xanthostigma (*Candelariella*) 62
XYLOGRAPHIA 112
- zonata* (*Enterographa*) 71
zopfii (*Cladonia*) 68