

NOTAS BREVES

Notas corológicas sobre flora gallega

M. HORJALES, N. REDONDO & A. BLANCO

Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo. Facultad de Ciencias
Universidad de Vigo. Apto. 874. 36200 Vigo. España

(Recibido, noviembre de 1996. Aceptado, enero de 1997)

Equisetum telmateia Ehrh.

ORENSE: A Veiga de Cascallá, 29TPH70, invade abundantemente, junto con *E. arvense* L., los prados húmedos de esta zona, 27-6-1996, M. Horjales, N. Redondo & A. Blanco.

Presenta tamaños muy inferiores a lo habitual en Galicia y un aspecto externo próximo a *E. arvense*. HAUKE (1978) señala la gran variabilidad morfológica que presenta *E. telmateia*. El estudio de la anatomía interna permite separar claramente estos dos táxones, por lo que es posible que *E. telmateia* sea más abundante en Galicia de lo que refleja la bibliografía y haya sido confundido con *E. arvense*, en algunos casos.

Creemos que se trata de una nueva cita para la provincia de Orense, según la bibliografía consultada.

Calepina irregularis (Asso) Thell.

PONTEVEDRA: Vigo-A Garrida- 29TNG 2268, en un rodal de robles y castaños, 13-III-1994, M. Horjales, N. Redondo & A. Blanco.

Creemos que se trata de una nueva cita para la provincia. Está citada en *Flora iberica* (1993) para la provincia de Orense, y entre paréntesis para la de Lugo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASTROVIEJO *et al.* (1986-1993). *Flora iberica I-IV*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
HAUKE, R.L. (1978). A taxonomic Monograph of *Equisetum* subgenus *Equisetum*. *Nova Hedwigia*, **30**:385-455.